

被黄褐色绒毛;花瓣卵状长圆形,长约5毫米,顶端外弯;雄蕊具短花丝,花药2室,长圆形,纵裂,药隔顶部附属物为广卵状。蒴果近球形,3瓣裂;种子广卵形,苍白色,有褐色斑点。花期春、夏季,果期秋季。

产海南、广西。生于灌丛或密林中。越南、缅甸、印度、斯里兰卡、马来西亚、澳大利亚东北部有分布。

2. 短柄三角车(拉汉种子植物名称) 短柄雷诺木(海南植物志)

Rinorea sessilis (Lour.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 42. 1891; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 42. 1934; 海南植物志 1: 357. 1964; 中国高等植物图鉴 2: 901. 图 3532. 1972. — *Pentaloba sessilis* Lour. Fl. Cochinch. 154. 1790. — *Alsodeia sessilis* Spreng. Syst. 1: 806. 1826.

灌木或小乔木,高1—2米。幼枝有不甚明显的叶痕,被黄褐色绒毛,老枝灰白色,无毛。叶互生,椭圆形或椭圆状披针形,长7—16厘米,宽1.5—6厘米,通常长12—14厘米,宽3.5—4.5厘米,先端具尾尖或长渐尖,边缘具疏锯齿,锯齿在叶前半部较密,无毛,叶脉不甚明显,下面较上面凸起,中脉在基部处被黄褐色毛;叶柄长约7毫米,幼时被黄褐色柔毛,老时变稀疏;托叶暗褐色,狭披针形或钻形,长约4毫米,略被毛,早落。花苍白色,近无梗,组成腋生密伞花序;萼片5,宿存,近三角形;花冠钟状,花瓣5,近相等,宿存,椭圆形;雄蕊有短花丝。蒴果近球形,长约2厘米;种子乳白色,近球形。果期5月。

产海南(陵水)。生于海拔1000米以下的疏林中。越南有分布。

3. 毛蕊三角车(新拟) 毛蕊三角草(云南植物研究)

Rinorea erianthera C. Y. Wu et C. Ho in Acta. Bot. Yunnan. 1(1): 149. 1979.

落叶灌木,高2—3米。小枝幼时黄褐色,被柔毛,老时淡紫褐色,无毛,具圆点状皮孔。叶在当年生长枝上较大而疏生,在二年生短枝上较小而簇生,长1.5—6.5厘米,宽0.6—2.5厘米,黄绿色,膜质,菱状椭圆形至倒卵状椭圆形,先端锐尖至短渐尖,基部楔形,边缘具细锯齿,幼时叶柄及托叶均被柔毛;叶柄极短,长约2—5毫米;托叶狭三角状披针形,脱落较晚,与叶柄几等长。单花或双花或三花组成聚伞花序,生于长枝叶腋内;花梗纤细,长1—1.5厘米,被毛,中部或以下具2枚长不足1毫米的小苞片;萼片5,黄绿色,长4.5—6毫米,宽2—5.5毫米,覆瓦状排列,外轮3枚,近圆形,密被脉纹,先端具小尖突,内轮2枚,椭圆形,脉纹不显,均背面被毛,边缘具纤毛;花瓣5,白色,干时淡褐色,狭披针形,长9—11毫米,宽1.5—2毫米,背面中部以上被毛,缘具纤毛,开花后反折;雄蕊5,淡黄白色,长约9毫米,花丝线形,长2.5—3.5毫米,花药线形,长与花丝等长或略长,腹面基部具垫状绵毛,药室顶端渐尖,具髯毛,药隔顶端附属物狭三角形,长不足1毫米;子房长球形,1室,具3—5棱,花柱纤细,直或作“S”形弯曲;未成熟种子圆肾形,扁平,褐色平滑不发亮。花期6—7月。

产四川(金阳,模式标本产地)。生于海拔1300米的灌丛中。