

2. 鳞隔堇属*——*Scyphellandra* Thw.

Thw. Enum. Pl. Zeyl. 21. 1864; 海南植物志 1: 358. 1964. —

Alsodeia Thou. Sect. *Scyphellandra* (Thw.) Hook. f. et Thoms.

in Fl. Brit. Ind. 1:189.1872, sine auct. comb.

灌木或半灌木。叶小,互生,全缘或有齿缺。花小,长1—2毫米,两性或单性,单生或簇生;萼片近相等;花瓣近相等,无爪,上部开展;雄蕊无花丝,药隔背部有小颗粒状鳞片,药隔顶端延伸为膜质附属物;花盘退化为5个分离的鳞片;子房有3个侧膜胎座,每胎座有胚珠1—3颗,花柱钻状,柱头顶生,微3裂。蒴果3瓣裂,少有2瓣裂;种子近球形,无毛。

本属有4种,分布于越南、泰国和斯里兰卡。我国有1种。

1. 鳞隔堇(中国种子植物科属词典) 茜菲堇(海南植物志) 图版 2:1—6

Scyphellandra pierreii H. de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France 55:33.1908; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2:42.1934; 海南植物志 1:358. 图182.1964; 中国高等植物图鉴 2:902. 图3533. 1972. —*Rinorea pierreii* (H. de Boiss.) Melch. in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 21(2):352. 1925.


直立灌木,高约1米。幼枝被短柔毛,老枝灰白色,无毛。茎下部的叶常2—3片簇生,上部的互生;叶片卵形或椭圆形,大小变异很大,大者长5厘米,宽2.5厘米或更大,小者长1.5厘米,宽8毫米或者更小,通常长3—4厘米,宽1.5—2厘米,边缘具细锯齿,先端钝或稍尖,叶脉稍凸起,略被柔毛;叶柄短,长约3毫米,被绒毛;托叶小,比叶柄短,披针形或近三角形,背部稍凸起,被短柔毛。花小,单性,辐射对称,腋生、单生或簇生;雄花:花梗纤细,长约5毫米,略被毛或无毛;萼片5,近三角形,有短毛;花瓣5,长圆形,外面略被毛,先端渐尖;雄蕊与花瓣几等长,花药2室,纵裂,药隔钻状,黄色;子房退化;雌花:花梗长约3毫米,无毛,基部有小苞片3—4枚,苞片近三角形;萼片宿存,近三角形,边缘有细缘毛;花瓣长圆形,外面略被毛;雄蕊退化,药隔披针形,显著,无花药;子房上位,卵圆形,无毛,花柱直立,柱头头状,浅3裂。蒴果长圆形,3瓣裂,偶有2瓣裂,顶端具尾尖。花期春、夏季,果期夏、秋季。

产海南。生于林缘或灌木林中。越南有分布。

3. 鼠鞭草属——*Hybanthus* Jacq. nom. cons.

Jacq. Enum. Pl. Carib. 2.1760; Baill. Bot. Medic. 2:841. 1884;

* 属的异名: 茜菲堇属(海南植物志)。



1—6. 鳞隔堇 *Scyphellandra pierrei* H. de Boiss.: 1. 花枝, 2. 叶片及托叶, 3. 雌花, 4. 雄花, 5. 退化雄蕊, 6. 雄蕊。7—13. 圆叶小堇菜 *Viola rockiana* W. Beck.: 7. 植株, 8. 萼片, 9. 上瓣, 10. 侧瓣, 11. 下瓣, 12. 雄蕊, 13. 雌蕊。(白建鲁绘)