

属名模式：鼻烟盒树 *Oncoba spinosa* Forssk.

本属约有 4—5 种；分布于热带非洲至南非（1），阿拉伯半岛等地区。我国云南南部（西双版纳）引种栽培。

1. 鼻烟盒树（西双版纳植物名录） 图版 1：1—6

Oncoba spinosa Forssk. Fl. Aegypt.-Arab. 1: 116. 1775; Warb. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (6a): 17. 1893; Gilg in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. 21: 401, fig. 172. 1925.

常绿乔木；有腋刺；树皮不裂。叶薄革质，宽椭圆形，长约 4.5 厘米，宽约 2.2 厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形或近圆形，边缘有浅锯齿，侧脉 5—6 对；叶柄长 0.5—1 厘米。花两性，单生于枝顶；直径约 5.5 厘米；花梗粗壮，长 2—3 厘米；萼片与花瓣同数，长 1.5—2.5 厘米，倒卵形，先端圆；雄蕊多数，花丝短，长约 2 毫米，花药线形，长约 2 毫米；子房宽圆形，长约 5 毫米，直径约 6 毫米，花柱短，长约 1 毫米，柱头盘状，多裂。浆果大，长约 4 厘米，直径约 4.2 厘米；种子多数，菱状椭圆形，长约 9 毫米，子叶大，叶状，倒卵圆形，胚乳丰富。花期春季，果期秋季。

原产热带非洲至阿拉伯半岛。我国云南西双版纳热带植物园有引种栽培，生长良好。

果实可食。

3. 大风子族 Trib. Pangieae Warb.

Warb. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (6a): 20. 1893;
Gilg in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. 21: 407.
1925; Hutch. Gen. Flow. Pl. 2: 206, 217. 1967.

单叶，互生。花单性，雌雄异株；花被片分离，轮状排列；花萼 3—5 片；花瓣存在，与萼片同数或数倍于萼片，并明显不同，在其基部内面有鳞片状附属物；雄蕊 5 枚或多数；子房上位，侧膜胎座 2—6 个，每个胎座上有胚珠 1 至多数。浆果大型，壳质，或浆果状蒴果。

本族约有 12 属，80 余种。分布于亚洲东南部、美洲中部、大洋洲（新几内亚岛）、大洋洲（美拉尼西亚）等地区。

3. 大风子属 *Hydnocarpus* Gaertn.

Gaertn. in Fruct. 1: 288, t. 60, f. 3. 1788; DC. Prodr. 1:
257. 1824; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 129. 1862; Warb. in



图版 1 1—6. 鼻烟盒树 *Oncoba spinosa* Forssk.: 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 雄蕊; 4. 雌蕊; 5. 果实;
6. 种子。(戴征雄绘)