

泰国等国家也有分布。模式标本采自广州。

材质优良，供家具、器具等用；亦为绿化丘陵及园林观赏树种。

2. 广东簕柃 (海南植物志) 簕血、簕子、红簕 (广东), 簕咸 (海南) 图版 4: 7

Scolopia saeva (Hance) Hance in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4, **8**: 217. 1862; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 191. 1872; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **14**: 39. 1935; 海南植物志 **1**: 452. 1964; 中国高等植物图鉴 **2**: 921. 图 3571. 1972; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 33. 1970. — *Phoberos saeva* Hance in Walp. Ann. Bot. Syst. **3**: 825. 1852. — *S. cinnamomifolia* Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine, Suppl. **1**: 207. 1939.

常绿小乔木或灌木，高 4—8 米；树皮浅灰色，不裂，树干有硬刺；幼枝无毛。叶革质，卵形、椭圆形或椭圆状披针形，长 6—8 厘米，宽 3—5 厘米，先端渐尖，基部楔形，两侧无腺体，边缘有疏离的浅波状锯齿，上面绿色，有光泽，下面淡绿色，两面无毛，近三出脉，侧脉纤细，网脉明显；叶柄长约 1 厘米。总状花序腋生或顶生，长为叶的一半；花小；萼片 5，卵形，长约 1.2 毫米，边缘有睫毛；花瓣 5 片，倒卵状长圆形，长约 2 毫米，仅边缘有睫毛；雄蕊多数，花丝丝状，长约 6 毫米，花药卵形，药隔顶端有三角状的附属物，无毛；花盘 8 裂，在雄蕊的外围；子房 1 室，侧膜胎座 2—3 个，每个胎座上有胚珠 2 颗；花柱粗壮，比雄蕊短。浆果红色，卵圆形，长约 8 毫米，顶端有宿存花柱，基部有宿存的花被；种子卵状长圆形，有棱角。花期夏秋，果期秋冬。

产福建、广东等省。生于干燥的平原区或山坡杂木林中。越南也有分布。

材质优良，供家具、农具、器具等用材，庭园供观赏。

3. 黄杨叶簕柃 (武汉植物学研究) 海南簕柃 (海南植物志) 图版 4: 5

Scolopia buxifolia Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. **55**: 524. 1908, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **1**: 229. 1909; Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 137. 1940; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 32. 1970; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 132. 1990. — *S. nana* Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine, Suppl. **1**: 208. 1939, syn. nov. — *S. hainanensis* Sleum. in Fedde, Rept. Sp. Nov. **41**: 123 1936, syn. nov.; 海南植物志 **1**: 453. 1964.

常绿小乔木或灌木，高 2—8 米；树皮灰褐色，有短枝，有时有刺；小枝无毛。叶革质，椭圆形，长 2—2.5 厘米，宽 1—1.5 厘米，两端近圆形，或基部为宽楔形，无腺体，全缘或有不明显的锯齿，两面无毛而光亮，网脉稀疏，明显；叶柄短，长约 3 毫米。总状花序通常生于小枝上部的叶腋，长 2—3 厘米，有柔毛；花小，白色，花梗长 0.5—1.1 厘米，无毛；萼片 4，稀 5 片，卵形，长 1—1.5 毫米，无毛，边缘有睫毛；



图版4 1—3. 蓊柃 *Scolopia chinensis* (Lour.) Clos: 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 叶片。4. 珍珠蓊柃 *Scolopia henryi* Sleum.: 叶片。5. 黄杨叶蓊柃 *Scolopia buxifolia* Gagnep.: 叶片。6. 台湾蓊柃 *Scolopia oldhamii* Hance: 叶片。7. 广东蓊柃 *Scolopia saeva* (Hance) Hance: 叶片。(戴征雄绘)