

**Homalium paniculiflorum** How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 36, fig. 3, pl. 2: 1. 1959. 海南植物志 **1**: 460. 1964; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 132. 1990; 广东植物志 **2**: 113. 1991. ——*H. cochinchinense* auct. non (Lour.) Druce; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **14** (1): 40. 1935, quoad specim. S. K. Lau 204, 540.

乔木或灌木，高 8—12 米；树皮灰色或黑灰色，不裂；小枝圆柱形，暗褐色，幼时密被短柔毛，不久脱落近无毛或无毛，有不规则棱条。叶薄革质，椭圆形或卵状长圆形，偶宽椭圆形，长 5—10 厘米，宽 3—6 厘米，先端尾尖至短尾尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有钝的疏齿，齿尖有腺体，腺体在下面明显，呈圆形，微下陷，两面无毛，或下面脉腋内有髯毛，干后呈淡褐色，中脉和侧脉在两面均突起，侧脉 5—8 对；叶柄长 4—6 毫米，被短柔毛。花多数，以 2—4 朵簇生或单个生于分枝上而组成圆锥状，圆锥花序顶生或腋生，长 9—11 厘米，密被短茸毛；花梗丝状，长 2—3.5 毫米，密被短茸毛，中部以上具节；花直径 4—6 毫米；萼筒短，倒圆锥形，长 2—2.5 毫米，直径约 1 毫米，被短茸毛，干时有明显纵槽纹；萼片狭长圆形，长 2—3.5 毫米，宽约 0.5 毫米，先端钝，两面近无毛，边缘有长睫毛；花瓣狭长圆形或倒披针形，边缘有长睫毛，比萼片稍长而宽；雄蕊长于花被，长约 4 毫米，下部有开展疏长毛或近无毛；花盘的腺体与雄蕊互生，呈宽圆锥形，长约 1 毫米，宽约 1.3 毫米，先端平坦；子房被开展疏柔毛；花柱长于雄蕊，通常 3，稀 2，略叉开，被开展疏毛；侧膜胎座 3，每个有倒垂的胚珠 4—5 颗。蒴果倒圆锥状，长 6—7 毫米，直径 1.5—2 毫米。花期秋季，果期冬季至春季。

产广东、海南。生于密林中、溪边灌丛中或海岸灌丛中，海拔 100—400 米。模式标本采自海南（崖县）。

木材供家具和器具等的用材。

#### 4. 显脉天料木（植物学报）

**Homalium phanerophlebium** How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 44, fig. 4. 1959; 海南植物志 **1**: 462. 1964; 广东植物志 **2**: 115. 1991.

##### 4a. 显脉天料木（原变种） 图版 5: 8

##### var. *phanerophlebium*

常绿乔木，高 8—12 米；树皮灰色或灰褐色；小枝圆柱形，幼时被短柔毛，老枝无毛，有条纹和皮孔。叶革质，椭圆状长圆形，长 3—14 厘米，宽 2—6 厘米，先端急尖至尾状渐尖，基部宽楔形，稀近圆形，边缘软骨质，微向外反卷，具疏圆钝齿，在背面之齿上具圆形下陷腺体，上面无毛有光泽，暗褐色，中脉和侧脉平坦，下面仅在脉腋有髯毛，带赤褐色，中脉和侧脉均突起，侧脉 6—7 对，近叶缘处网结；叶柄长 8—15 毫米，幼时被短柔毛，以后脱落。花芳香，白色，多数，常 3—4 朵簇生稀单个生于分枝