

4—5 毫米，宽 1—1.5 毫米，先端稍钝，两面疏被长柔毛，边缘密被睫毛；花瓣倒披针形，稍比萼片长，先端尖或钝，两面被长柔毛，边缘密被睫毛，结果时有明显脉纹；雄蕊 7，花丝与花瓣近等长，下部被开展长柔毛；子房被开展长柔毛，花柱 3—4，丝状，长约 3 毫米，结果时加倍之，下部被开展长柔毛；侧膜胎座 3—4，每个有胚珠 3—4 颗。蒴果倒圆锥形，长 5—7 毫米，被长柔毛。花期 6—12 月，果期 7 月至次年春季。

产海南（崖县、保亭、昌江、陵水、万宁、乐东、琼中、定安）。生于低海拔山地林中。越南北部也有分布。模式标本采自凤上村。

木材供家具、农具及器具等用。

11. 斯里兰卡天料木

Homalium ceylanicum (Gardn.) Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. **4**: 35. 1859; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 596. 1879; Trimen, Handb. Fl. Ceyl. **2**: 239. 1894; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 81. 1970, p. p.; Sleum. in Blumea **30** (2): 219. 1985, p. p.; 西藏植物志 **2**: 303. 1986; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 132. 1990. ——*Blackwellia ceylanica* Gardn. in Journ. Nat. Hist. **7**: 452. 1847. ——*Homalium balansae* Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **3**: 246. 1914; et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1007. 1921. ——*Homalium laoticum* Gagnep. var. *glabratum* C. Y. Wu in Acta Phytotax. Sin. **6** (2): 232. 1957; How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 43. 1959; 云南植物志 **4**: 202. 1986.

11a. 斯里兰卡天料木（原变种） 图版 6: 5

var. **ceylanicum**

乔木，高 6—20（—40）米；树皮粗糙；小枝圆柱形，棕褐色，密具白色突起的椭圆形皮孔，无毛。叶薄革质至厚纸质，椭圆形至长圆形，长 10—18 厘米，宽 4.5—8 厘米，先端钝，急尖或短渐尖，基部宽楔形至近圆形，边缘全缘或具极疏钝齿，两面无毛，主脉在上面凹下，在下面凸起，侧脉 7—8 对，在下面凸起；叶柄长 8—10 毫米，无毛。花多数，4—6 朵簇生而排成总状，总状花序腋生，长 10—20 厘米，稀达 30 厘米，花序梗被短柔毛；花梗短，长约 3—5 毫米，被短柔毛，中部以上具关节；萼筒陀螺状，长约 1 毫米，被短柔毛，萼片 5—6，线状长圆形，长 1—1.8 毫米，被短柔毛，边缘密被短睫毛；花瓣 5—6，线状长圆形，长约 2 毫米，宽约 0.6 毫米，外面疏被短柔毛，边缘密被短睫毛；雄蕊 4—6，花丝无毛；花盘腺体 7—10 个，与萼片对生，陀螺状，顶端平截；子房外面有柔毛；侧膜胎座 4—6 个，每个胎座上有 5—6 颗胚珠，花柱 4—6，长约 3 毫米，无毛。花期 4—6 月。

产云南、西藏。生于海拔 630—1200 米的山谷疏林中和林缘。斯里兰卡、印度、老挝、泰国、越南也有分布。

木材坚韧、纹理细密，可供建筑、家具等用。