

序梗很短。浆果近似原变种。

产广东(连县)(即模式产地)。生于海拔 300 米的常绿阔叶林中。

从《植物研究》(Bull. Bot. Res. 14 (3): 225, pl. 2, fig. 1. 1994)看,印刷很不清楚,仅枝顶似有一果。但是否为本种,深致怀疑。(主编吴征镒注)

4. 山桂花(中国高等植物图鉴) 木勒木(海南植物志)

Bennettiodendron leprosipes (Clos) Merr. in Journ. Arn. Arb. **8**: 11. 1927; Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 136, fig. 10. 1940; Sleum. in Van Steenis, Fl. Malesiana, ser. 1, **5** (1): 64. 1954; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6** (2): 230. 1957; 海南植物志 **1**: 456, 图 252. 1964; 中国高等植物图鉴 **2**: 926, 图 3581. 1972; Sleum. in Blumea **30** (2): 239. 1985; G. S. Fan et Y. C. Hsu in Guihaia **9** (1): 32. 1989; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 132. 1990; 广西植物志 **1**: 659. 1991. ——*Xylosma leprosipes* Clos in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4, **8**: 233. 1857. ——*Bennettia longipes* Oliv. in Hooker's Icon. Pl. **16**: t. 1596. 1887. ——*Myroxylon leprosipes* O. Kuntze Rev. Gen. Pl. **1**: 44. 1891. ——*Bennettiodendron longipes* (Oliv.) Merr. in Journ. Arn. Arb. **8**: 11. 1927; Merr. et Chun in Sunyatsenia **1**: 136, fig. 16. 1910; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6** (2): 230. 1957; 海南植物志 **1**: 455. 1964; 广西植物志 **1**: 659. 1991.

4a. 山桂花(原变种) 图版 11: 1—4

var. **leprosipes**

常绿小乔木,高 8—15 米,近无毛;树皮灰褐色,不裂,有臭味。叶近革质,倒卵状长圆形或长圆状椭圆形,长 4—18 厘米,宽 3.5—7 厘米,先端短渐尖,基部渐狭,边缘有粗齿和带不整齐的腺齿,两面无毛,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,中脉在上面凹,下面突起,侧脉 5—10 对;叶柄长 2—4 厘米,稀 6—8 厘米,无毛。圆锥花序顶生,长 5—10 厘米,稀 20 厘米,多分枝,幼时被黄棕色毛,以后脱落无毛;花浅灰色或黄绿色,有芳香;花梗长 3—5 毫米,在果期花序轴增粗;苞片小,锥状或披针形,早落;萼片为卵形,长 3—4 毫米,顶端圆形,有缘毛;雄花:有多数雄蕊,花丝有毛,伸出花冠,花药为黄色;腺体肉质,有短毛;雌花:萼片和退化雄蕊较雄花短一半,子房长圆形,无毛,两端尖,不完全的 3 室,每个胎座上有 2 至多颗胚珠,花柱通常 3 个,柱头长圆形,稍凹。浆果成熟时红色至黄红色,球形,发亮,直径 5—8 毫米;种子 1—2 粒,扁圆形或球形,子叶黄绿色。花期 2—6 月,果期 4—11 月。

产海南、广东、广西和云南等省区。生于海拔 200—1450 米(多数在 1000 米以上)的山坡和山谷混交林或灌丛中。印度、缅甸、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国家也有分布。

4b. 皱叶山桂花(变种)