

14. 梔子皮属 *Itoa* Hemsl.

Hemsl. in Hook. Icon. Pl. **27**: 2688. 1901; Gilg in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. **21**: 444. 1925; Sleum. in Van Steenis, Malesiana ser. 1, **5** (1): 12. 1954; Hutch. Gen. Flow. Pl. **2**: 225. 1967.

乔木。单叶，互生，薄革质，大型叶，长椭圆形，边缘有锯齿，羽状叶脉；叶有柄；托叶缺。花单性，雌雄异株；雄花为直立的顶生圆锥花序，花梗短；雌花单一，顶生或腋生，花梗在果期延长，中间有关节，萼片3—4片，革质，三角状卵形；花瓣缺；雄花的雄蕊为多数，花丝极短，花药小，底着药；有退化的子房；雌花的子房长圆形，1室，侧膜胎座6—8个，稀5个，每个胎座上有多数胚珠，花柱6—8，柱头短，6—8裂。蒴果大，卵形或长圆形，木质，有毛，6—8瓣裂，稀5裂，从顶端和基部裂开，中部不裂；种子多数，扁平，有膜质翅包围，内层的种子呈辐射状，外层的种子排列整齐；胚大，垂直；子叶圆形。

属名模式：*Itoa orientalis* Hemsl.

本属约有2种及1变种。间断分布于中国亚热带的西南至越南北方和东马来西亚（苏拉威西、马鲁古和新几内亚岛）。

1. 梔子皮（中国高等植物图鉴） 伊桐（中国树木分类学），盐巴菜（西畴），长叶子老重、木桃果（屏边），米稔怀、牛眼果、白心树、墨当鸣、弄七（广西）

Itoa orientalis Hemsl. in Hook. Icon. Pl. **27**: t. 2688. 1901; Wils. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 286. 1913; Chun China Econ. Trees 252. 1922; Gilg. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. **21**: 444. 1925; 陈嵘，中国树木分类学 856，图 752. 1937 中国森林植物学 845. 1935; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine Suppl. **1**: 199. 1939; 峨眉植物图志 **1** (1): 76, 图 76. 1944; 经济植物手册（下册一分册）1047. 1957; 中国高等植物图鉴 **2**: 927, 图 3585. 1972; M. Lescot. in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 68. 1970; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 133. 1990; 广西植物志 **1**: 656. 1991. ——*Carrierea vieillardii* Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **3**: 368. 1918. ——*Mesaulosperma vieillardii* Sloot. in Bull. Jahrb. Bot. Brit. **3** (7): 384. 1925.

1a. 梔子皮（原变种） 图版 16: 1—4

var. *orientalis*

落叶乔木，高8—20米；树皮灰色或浅灰色，光滑；幼枝淡灰色，皮孔明显，当年生枝有疏毛，老枝无毛。叶大型，薄革质，椭圆形或卵状长圆形或长圆状倒卵形，长