

- 1. 印度脚骨脆 *C. kurzii* C. B. Clarke
4. 叶长圆形, 干后绿褐色; 果实近圆形, 无梗..... 2. 脚骨脆 *C. balansae* Gagnep.
3. 老叶仅沿脉有疏毛。
5. 枝条较小, 性脆; 叶柄较短; 花有梗..... 3. 爪哇脚骨脆 *C. velutina* Bl.
5. 枝条稍粗, 性柔软; 叶柄较长; 花近无梗..... 4. 云南脚骨脆 *C. yunnanensis* How et Ko
2. 老枝、老叶均无毛。
6. 叶脉两面明显。
7. 团伞花序, 花近无梗.....
- 5. 石生脚骨脆 *C. calciphila* C. Y. Wu et Y. C. Huang ex S. Y. Bao
7. 丛生花序, 花有梗..... 6. 曲枝脚骨脆 *C. flexuosa* Craib
6. 叶脉仅下面明显。
8. 叶长圆形, 干后绿褐色; 果实较长..... 7. 膜叶脚骨脆 *C. membranacea* Hance
8. 叶披针状长卵形, 干后黄绿色; 果实较小..... 8. 球花脚骨脆 *C. glomerata* Roxb.
1. 幼枝、幼叶和老叶均无毛。
9. 叶之侧脉 6—9 对。
10. 叶革质, 长圆形, 侧脉 7—9 对, 干后两面同色; 花梗长 0.5—1 厘米.....
- 9. 中越脚骨脆 *C. virescens* Pierr. ex Gagnep.
10. 叶薄革质, 椭圆形, 侧脉 6—8 对, 干后两面异色; 花梗长约 3 毫米.....
- 10. 海南脚骨脆 *C. aequilateralis* Merr.
9. 叶之侧脉 10—12 (—14) 对, 厚纸质, 椭圆形或椭圆状长圆形; 花梗长约 7 毫米.....
- 11. 香味脚骨脆 *C. graveolens* Dalz.
1. 印度脚骨脆 (中国植物学会 55 周年学术论文摘要汇编) 印度嘉赐树 (云南植物研究), 滇南脚骨脆 (武汉植物学研究)

Casearia kurzii C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 594. 1879; S. Y. Bao in Acta Bot. Yunnan. 5 (4): 376. 1983; 云南植物志 4: 197. 1986; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. 8 (2): 133. 1990.

1a. 印度脚骨脆 (原变种) 图版 17: 3

var. *kurzii*

小乔木, 高 5—12 米; 树皮棕灰色, 通常不裂; 小枝圆柱形, 棕褐色, 被疏柔毛。叶膜质, 披针状长圆形, 长 9—21 厘米, 宽 4—8 厘米, 先端急尖, 基部圆形, 偏斜, 边缘有圆钝齿或近全缘, 上面无毛, 下面有黄色柔毛, 沿脉较密, 侧脉 (8—) 10—12 对, 纤细, 弧状, 小脉横行, 明显, 在上面平坦, 在下面突起; 叶柄长 0.5—1.5 厘米, 有黄色粗毛。花小, 黄绿色, 常数朵, 形成团伞花序, 腋生; 花序梗极短; 苞片卵形, 长约 0.5—0.7 毫米, 外面被毛; 花梗长 5—8 毫米, 被柔毛; 萼片 5 片, 卵状长圆形, 长约 3 毫米, 宽约 1.5 毫米, 顶端圆形, 外面有粗毛; 花瓣缺; 雄蕊 7 枚, 长约 2 毫米, 花丝有疏毛, 花药卵圆形, 长约半毫米; 退化雄蕊 7 枚, 与正常雄蕊在基部联合,