

毛；子房椭圆状，长3—4毫米，侧膜胎座2个，每个胎座上有胚珠2—4颗，花柱短，长约1毫米，柱头盘状。果实长椭圆形，长1—1.2厘米，直径4—5毫米，无毛，成熟时黄色，干后黑色；种子数粒，淡黄色；果梗长2—3毫米，有毛。花期4—5月，果期6月至次年3月。

产福建、广东、海南、广西、贵州、云南等省区。生于海拔650米以下的低海拔疏林中和林缘。越南也有分布。

2b. **景东脚骨脆** (新拟名) (变种) 景东嘉赐树 (云南植物研究)

var. *subglabra* S. Y. Bao in Acta Bot. Yunnan. **5** (4): 377. 1983.

本变种和原变种的区别是：叶上面无毛，下面和枝条近无毛，叶干后上面褐绿色，下面淡棕色，侧脉两面明显，似苦楮的叶。花期4—11月。

产云南 (景东)。生于海拔1800米的林边。

3. **爪哇脚骨脆** (新拟) 爪哇嘉赐树 (云南植物研究)，毛叶嘉赐树 (武汉植物学研究) 图版 17: 6

Casearia velutina Bl. in Mus. Bot. Lugd.-Bat. **1**: 253. 1850; Sleum. in Van Steenis, Fl. Malesiana ser. **1**, **5** (1): 91. 1954; S. Y. Bao in Acta Bot. Yunnan. **5** (4): 378. 1983; Sleum. in Blumea **30** (2): 249. 1985; 云南植物志 **4**: 200. 1986; 福建植物志 **4**: 15. 1989; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (1): 133. 1990.

灌木，高1.5—2.5米；小枝棕黄色，密生短柔毛，有棱脊，性脆。叶纸质，卵状长圆形，稀卵形，长5—8厘米，宽3—4厘米，先端渐尖，或急尖，基部圆形，边缘有锐齿，上面深绿色，下面淡绿色，两面幼时有密的短柔毛，老时无毛或沿中脉、侧脉有毛，侧脉6—8对，弯拱上升，或呈40°角度上升，在叶缘网结，小脉横生，下面显著；叶柄长4—5毫米，有毛。花小，两性，淡紫色，数朵簇生于叶腋；无总梗，基部有鳞片状苞片；花梗纤细，长约2毫米，近无毛；花直径约3毫米；萼片5片，近圆形，长约2毫米，边缘膜质，外面有疏毛；花瓣缺；雄蕊5—6枚，花丝较长，长约3毫米，有疏毛，花药椭圆形；退化雄蕊5—6枚，扁平，顶端有疏毛；子房近圆形，上部稍有柔毛。花期12月，果期次年春季。

产云南南部 (勐腊)。生于海拔700米的山脚溪边林下。印度尼西亚 (苏门答腊)、爪哇等地也有分布。

4. **云南脚骨脆** (新拟) 云南嘉赐树 (植物学报) 图版 17: 4—5

Casearia yunnanensis How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 28, Pl. **1**: 1. 1959; 云南植物志 **4**: 200. 1986.

灌木，2—3米高；树皮褐色，不裂；小枝圆柱形，蜿蜒状，有密的污黄色柔毛，柔软。叶膜质，长圆状椭圆形，长10—16厘米，宽4—6厘米，先端尾状渐尖，稍弯，尖头长约1.5厘米，基部宽楔形，边缘有疏小的锯齿，齿尖有束毛，上面浓绿色，沿叶



图版 17 1—2. 脚骨脆 *Casearia balansae* Gagnep.: 1. 花枝; 2. 果实。3. 印度脚骨脆 *Casearia kurzii* C. B. Clarke: 果实。4—5. 云南脚骨脆 *Casearia yunnanensis* How et Ko: 4. 叶; 5. 果实。6. 爪哇脚骨脆 *Casearia velutina* Bl.: 果枝。7. 中越脚骨脆 *Casearia virescens* Pierre et Gagnep.: 果枝。(戴征雄绘)