

Journ. Bot. Res. **8** (2): 133. 1990. — *Casearia harmandiana* Pierre ex Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **3**: 245. 1914, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 997. 1921. — *Alsodeia membranacea* auct. non King: H. de Boissiec. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **1**: 215. 1909, p. p.

小乔木或灌木，高 1—4 米；树皮灰黄色到玫瑰色，有斑痕，不裂；幼枝圆柱形，有软毛，速变无毛。叶膜质或纸质，倒披针形或长圆状披针形到宽披针形，长 3.5—13 厘米，稀 15 厘米，宽 1—5 厘米，先端渐尖，有尖头，基部楔形，边缘的锯齿锐尖，有规则或不规则的坚硬小齿，齿尖 0.3—0.5 毫米，上面无毛或近无毛，下面被柔毛或近无毛，有透明腺点和腺条，中脉在下面突起，侧脉 5—10 对，在上面稍明显，近边缘处汇合，在下面不明显；叶柄短，长 3—5 毫米，有短毛；托叶锥形，狭三角形，长 2—4 毫米，外面有细毛，边缘有疏睫毛，宿存。团伞花序腋生，花少，近无总梗，长 3—5 毫米，无毛；花梗短，长 1 毫米，无毛；苞片卵形，长 2 毫米，外面有细毛到无毛，内面无毛；花萼 4—5 片，基部稍连结，倒卵形，长 2—3 毫米，两面有毛到无毛，边缘有缘毛；花瓣缺；雄蕊 8 枚，花丝基部与退化雄蕊连结，长 0.8 毫米；退化雄蕊长圆形，顶端尖，有毛；子房圆锥形，高 1.5 毫米，有毛，花柱短，0.5—1.0 毫米，有毛，柱头球形，3 裂。蒴果肉质，椭圆形，直径 1.5 厘米或 1 厘米，黄色，有 3—4 条棱脊，干后上面有发亮的斑点，种子 3—8 粒，卵形，长 5—6 毫米，白色，有光泽，顶端狭裂。花期春季，果期冬日。

产云南（西畴、景东）。生于低海拔灌丛中和林中。泰国（清迈，模式产地）、老挝、越南也有分布。

7. 膜叶脚骨脆（新拟） 膜叶嘉赐树（植物学报），台湾嘉赐树（台湾树木志），薄叶嘉赐树（台湾高等植物彩色图志），薄叶嘉赐木（台湾志）

Casearia membranacea Hance in Journ. Bot. **6**: 113. 1863; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 311. 1904; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 999. 1927; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **5**: 132. 1927; How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 31. 1959; Li, Fl. Woody Taiwana 603, f. 237. 1963; 海南植物志 **1**: 465. 1964; 台湾树木志 402. 1988; 台湾高等植物彩色图志 510, 彩图 575. 1988; Li et H. C. Lo in Fl. Taiwan ed. 2, **3**: 794, pl. 399. 1993. — *Casearia merrillii* Hayata, Icon. Pl. Formos **3**: 30, t. 3. 1913; Kanehira, Formos. Trees, ed. 2. 475. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 861, 图 257. 1953; How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 31. 1959.

7a. 膜叶脚骨脆（原变型） 图版 18: 6—7

f. *membranacea*

常绿乔木或灌木，高 4—15 米；树皮灰褐色，不裂；小枝细弱，蜿蜒状，有小棱