

条，绿色，无毛。叶膜质，排成二列，长椭圆形或卵状长椭圆形，稀椭圆形，长5—15厘米，宽3—6厘米，稀为7.5厘米，先端短尖而钝，有的锐尖，基部宽楔形至钝，通常不对称，边缘浅波状或有不明显的钝齿，上面亮绿色，下面淡绿色，有橙黄色、透明的腺点和腺条，中脉在上面平坦或稍凹，在下面突起，侧脉5—8对，弯拱上升，在近边缘处消失，细脉网状；叶柄长0.6—1.2厘米，近无毛；托叶细小，早落。花两性，单生或数朵簇生于叶腋，绿色或黄绿色，直径3—4毫米；花梗长6—9毫米，有粉状毛或近无毛；苞片圆形，长约1毫米，有绒毛；萼片5片，长椭圆状卵形或长椭圆形，长2—3毫米，先端钝，基部稍合生，外面有柔毛，内面无毛，边缘有睫毛；雄蕊8枚，花丝有柔毛，基部稍与萼片联合，花药卵状长椭圆形，顶端凹下，基部心状；鳞片（退化雄蕊）8枚，与雄蕊互生，棍状，与花丝等长；子房圆锥形，无毛，1室，侧膜胎座3个，每个胎座上有4颗胚珠，胚直立，花柱短，柱头头状，2—3浅裂。蒴果卵状或卵状椭圆形，长1.5—3厘米，直径1—2厘米，通常有8棱，成熟时带黑色，无毛；种子卵形，长4毫米。花期7—8月，果期10月至次年春季。

产台湾、海南、广东、广西等省区。生于低海拔的山地林中。越南也有分布。模式标本采自海南崖县。

木材供家具、器具和农具等的用材。

7b. 黑叶脚骨脆（变型）

f. **nigrescens** S. S. Lai in Bull. Bot. Ress. **14** (3): 229, pl. 3, fig. 4. 1994.

本变型和原变型的区别是：叶披针状长圆形，近革质，干后黑色；蒴果3瓣裂，有瘤状突起。花期7—10月，果期8—12月。

产广西（龙津县大青山）。

8. 球花脚骨脆（中国高等植物图鉴） 嘉赐树（植物学报）

Casearia glomerata Roxb. in Hort. Beng. 33. 1814, non nud. et Fl. Ind. ed. 2. Carey. **2**: 419. 1832, descr.; Benth. Fl. Hong. 122. 1861; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 591. 1879; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 311. 1904; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. add. ser. **10**: 110. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine **2**: 999. 1921; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **5**: 132. 1927; 陈嵘，中国树木分类学（二版）861. 1953; 广州植物志 180, 图 84. 1956; How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 30. 1959; 海南植物志 **1**: 463. 1964; 中国高等植物图鉴 **2**: 929, 图 3587. 1972; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 62. 1970; 西藏植物志 **3**: 303. 1986.

8a. 球果脚骨脆（原变种） 图版 18: 1

var. **glomerata**

乔木或灌木，高4—10米；树皮灰褐色，不裂；幼枝有棱和柔毛，老枝无毛。叶薄