

组 1. 多花组 Sect. Decaloba DC. in Mém. Soc. Phys. Geneve **1**: 435. 1822; et Prodr. **3**: 325. 1828; Harms in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. **21**: 498. 1925; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6** (2): 233. 1957; G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 107. 1967. ——Decaloba M. Roem. Synops. **2**: 152. 1864.

总苞片缺或较小，与花远离。花瓣存在；外副花冠裂片 1—2 轮，内副花冠褶状或波状褶状。叶全缘或 2—3 裂；叶柄具腺体。


本组有下列 13 种。

1. 长叶西番莲（云南植物志） 八蕊西番莲、毛蛇王藤（广西） 图版 25: 1—7

Passiflora siamica Craib in Kew Bull. **1911**: 55. 1911 et in Fl. Siam. Enum. **1**: 745. 1931; G. Cusset in Adansonia **7**: 376. 1967; Wilde in Blumea **20**: 240, pl. 2, fig. m. 1972; 云南植物志 **1**: 42. 1977; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 57. 1984. ——*P. octandra* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **25**: 128. 1919 et in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine **2**: 1021. 1921, (incl. var. attopensis et var. cochinchinensis) non Thomps. ex DC. Prodr. **3**: 337. 1828, nom. nud. pro syn.; Craib in Fl. Siam. Enum. **1**: 744. 1931; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6**: 236. 1957; G. Cusset in Fl. Cambodge, Laos Vietnam **5**: 129. 1967. ——*P. wangii* Hu, nom. nud. sec. C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6**: 236. 1957.

木质藤本，长 6—8 米。茎四棱形，具条纹，密被锈色平展柔毛。叶近革质，卵状椭圆形至披针形，长 6—18 (—25) 厘米，宽 2.5—7 厘米，顶端急尖或渐尖，基部楔形或近心形，多被柔毛或糙伏毛，下面尤密，具 2—8 个腺体；叶柄长 1—4 厘米，常在下部具 2 个杯状腺体。花序近无梗，在卷须两侧对生，被锈色柔毛，有 4—15 朵花；花白色，直径约 1.5 厘米；花梗长 5—20 毫米，被锈色毛；萼片 5 枚，边缘膜质透明，长 9—12 毫米，外面顶端无角状附属器，被锈色柔毛；外副花冠裂片 2 轮，丝状，外轮长 7—10 毫米，内轮长 1.5—4 毫米，内副花冠褶状，长 2—2.5 毫米；花盘高约 0.5 毫米；雌雄蕊柄长 3—5 毫米；雄蕊 5—8 枚，花丝长 10—11 毫米，基部合生；子房近无柄，椭圆球状，长 2—3 毫米，宽 1.5—2.5 毫米，被毛；花柱 3—5 枚，直立，长 4—9 毫米，基部合生。浆果近球形，直径 1.5—2 厘米，被疏毛。种子多数，斜三角状椭圆形，扁平，棕黑色，长约 3 毫米，宽约 4 毫米，顶端具 1 尖头。花期 3—4 月，果期 6—7 月。

产云南（西双版纳）、广西（桂平）。生于海拔 540—1600 米的疏林、灌丛中。印度东北部、缅甸、泰国、老挝、越南等均有分布。



图版 25 1—7. 长叶西番莲 *Passiflora siamica* Craib.: 1. 果枝; 2. 叶正面 (毛被放大); 3. 叶背面 (毛被放大); 4. 花 (纵切面); 5. 雌雄蕊柄; 6. 内花冠; 7. 花盘。8—11. 龙珠果 *Passiflora foetida* Linn.: 8. 叶枝; 9. 果实; 10. 种子; 11. 苞片。(李锡畴绘)