

Lecomte, in Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1021. 1921. — *Passiflora* sp. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6** (2): 236. 1957, in nota—*Passiflora cochinchinensis* Spreng. ssp. *glaberrima* (Gagnep.) G. Cusset in Fl. Cambodge, Laos, Vietnam **5**: 127. 1967.

与原变种的区别为叶两面无毛。

产云南（河口、小南溪）。生于海拔 120—140 米。老挝（川塘），越南（山萝、老街）均有分布。模式标本采自老挝。

3. 广东西番莲（广西植物名录） 图版 24: 7—8

Passiflora kwangtungensis Merr. in Lingn. Soc. Journ. **13**: 38. 1934; G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 110. 1967, in clavi; Wilde in Blumea **20**: 243. 1972; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 58. 1984.


草质藤本，长约 5—6 米。茎纤细，无毛，具细条纹。叶膜质，互生，披针形至长圆状披针形，长 6—13 厘米，宽 2—4（—6）厘米，先端长渐尖，基部心形，全缘，下面下部被不明显的短柔毛，无腺体，基生三出腺，侧脉内弯，网脉疏散而不显著；叶柄长 1—2 厘米，上部或近中部具 2 个盘状小腺体。花序无梗，成对生于纤细卷须的两侧，有 1—2 朵花；花小形，白色，直径达 1.5—2 厘米；萼片 5 枚，膜质，窄长圆形，长 8—9 毫米，宽约 2.5 毫米，外面顶端不具角状附属器；花瓣 5 枚，与萼片近似，等大；外副花冠裂片 1 轮，丝状，长 2—3 毫米，顶端近尖，内副花冠褶状高 1.5 毫米；花盘高 0.3 毫米；雌雄蕊柄长 4.5 毫米，无毛；雄蕊 5 枚，花丝扁平，长 3.5 毫米，花药长圆形，长 2.5 毫米；子房无柄，椭圆球形，长 2.5 毫米，被散生柔毛与稀疏白色腺体；花柱 3，长 3—4 毫米，外弯，柱头头状。浆果球形，直径 1—1.5 厘米，无毛；种子多数，椭圆形，淡棕黄色，长约 3 毫米，扁平，顶端具小尖头。花期 3—5 月，果期 6—7 月。

产广东北部、广西东北部、江西东南部。生于海拔 650 米的林边灌丛中。模式标本采自广东乐昌。

4. 心叶西番莲（云南植物志） 图版 23: 10—11

Passiflora eberhardtii Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1020. 1921; Harms in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. **21**: 498. 1925; G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 119. 1967; Wilde in Blumea **20**: 242. 1972; 云南植物志 **1**: 45. 1977; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 58. 1984.

木质藤本，茎被微柔毛。叶近革质，宽卵形，长约 15 厘米，宽约 12 厘米，先端急尖至短渐尖，基部心形，全缘，上面无毛，下面密被淡黄色微柔毛并具有 20—50 枚散生小腺体，两面网脉极细，突起；叶柄长 5—6 厘米，被微柔毛，基部具 2 个大形杯状腺体。花序成对，复伞房状，多毛，花后花序梗及花梗均俯倾，具关节，有花 15—20



图版 24 1—6. 杯叶西番莲 *Passiflora cupiformis* Mast.: 1. 花枝; 2. 果形; 3. 萼片; 4. 花 (纵切); 5. 雌蕊、雄蕊及雌雄蕊柄; 6. 种子。7—8. 广东西番莲 *Passiflora kwangtungensis* Merr.: 7. 果枝; 8. 种子。9. 蝴蝶藤 *Passiflora papilio* Li, 9. 叶枝。(李锡畴绘)