

轮，外轮长1—2厘米，内轮长约5毫米；内副花冠膜质，褶状，顶端流苏状；雌雄蕊柄长约1厘米；雄蕊5枚，花丝长约1厘米，基部合生，花药长圆形，长约8毫米；被疏柔毛；子房卵球形，密被黄色疏柔毛，花柱3枚，离生，长约1厘米，柱头头状。浆果卵形或椭圆形，直径约3厘米；种子多数，长约3毫米，灰黑色。

产广西（龙门、桂平）、海南（尖峰岭）。模式标本采自海南尖峰岭。

8. 山峰西番莲 石山南星、燕子尾（云南）

Passiflora jugorum W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **9**: 115. 1916; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6**: 235. 1957; G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 109. 1967, in clavi; Wilde in Blumea **20**: 233. 1972; 云南植物志 **1**: 47. 1977; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 59. 1984. ——*P. burmanica* Chakravarty in Bull. Bot. Soc. Beng. **3**, **1**: 49. 1949. (1951).

木质藤本，长达8米；茎圆柱形，被稀疏白色柔毛，有条纹。叶坚纸质，长3—11厘米，宽3—10厘米，先端截形，略成三尖头状或2浅裂，基部宽圆形至心形，下面被淡棕色柔毛，近顶部具2—4枚小腺体，裂片三角形，长0.5—1厘米，急尖至渐尖；叶柄密被淡棕色柔毛，长3—5厘米，从基部往上约1/3处具2枚腺体。花序为聚伞状伞房花序，成对生于粗壮卷须的两侧，有5—15朵花，被灰白色或棕色柔毛；花白色，直径3—4厘米；花梗长2.5—3厘米，被疏柔毛；萼片5枚，长1—2厘米，外面淡紫色，无毛，外面顶端不具角状附属器；外副花冠裂片2轮，丝状，外轮长6—8毫米，内轮长2—3毫米，内副花冠褶状，高2.5—3毫米；具花盘，高约0.5毫米；雌雄蕊柄长7—10毫米；雄蕊5枚，花丝长6—10毫米，基部合生；子房椭圆球形，无柄，无毛；花柱3枚，分离，长约4—5毫米。浆果近球形至椭圆球形，长3.5—4.5厘米，被蜡粉，无毛；种子多数，长圆形，长约6毫米，扁平，淡黄色。花期3—4月，果期5—7月。

产云南西南部和东南部。生于海拔1000—1800米的湿润疏林或杂木灌丛中。缅甸（克钦邦、八莫）亦有分布。模式标本采自云南腾冲。

根可入药，有健胃消食、止痛消炎之效。

9. 镰叶西番莲 （云南植物志）锅铲叶、半截叶、金边莲（云南）

Passiflora wilsonii Hemsl. in Kew Bull. 1908: 17. 1908; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 473. 1911; Y. C. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **6**: 234. 1957, descr. fr. add.; G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 109. 1967, in clavi; Wilde in Blumea **20**: 233. 1972; 云南植物志 **1**: 47. 1977; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 59. 1984. ——*P. celata* G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 122. 1967. ——*P. spirei* G. Cusset in Fl. Cambodge Laos Vietnam **5**: 130. 1967. ——*P. yunnanensis* Franch. nom. p. p. sec. G. Cusset in Fl. Cam-