

bodge Laos Vietnam 5: 122. 1967 et Adansonia 7: 375. 1967.

草质藤本，长6—10米；茎被稀疏柔毛。叶纸质，长4—6—11厘米，宽(3.5—)6—13厘米，先端截形，三尖头状或微呈2—3裂，基部宽圆形至近心形，无毛，下面靠上部有4个腺体，裂片长达1.5厘米，先端锐尖；叶柄长2—2.5厘米，从基部往上1/5—1/3处具有2个腺体。花序近无柄，在卷须两侧对生，有2—15朵花，无毛或被疏柔毛；花白色，直径2—2.5厘米；花梗长5—15毫米；萼片5枚，外面顶端不具角状附属器，无毛；外副花冠裂片1轮，丝状，长3—6毫米，内副花冠褶状，长约2毫米；花盘高2—3毫米；雌雄蕊柄长6—10毫米；雄蕊5枚，花丝长4—6毫米，分离；子房椭圆球形，无柄，长2—3毫米，无毛；花柱3枚，分离，长3—5毫米。浆果近球形，直径2.5—3厘米，无毛，初被白粉，熟时紫黑色；种子多数，椭圆形，长约5毫米，暗黄色，顶端具尖头。 果期7月。

产云南西南部(镇康)、南部(思茅)、东南部(金平、屏边、西畴、麻栗坡)，西藏(墨脱)。生于海拔1300—2500米的山坡灌丛中。缅甸(掸邦)、泰国、老挝和越南均有分布。模式标本采自思茅。

全草入药，有舒筋活络、散瘀活血、止咳化痰之效。

10. 蝴蝶藤 (广西植物名录) 图版 24: 9


*Passiflora papilio* Li in Journ. Arn. Arb. 24: 447. 1943; G. Cusset in Adansonia 7: 375. 1967, in clavi; Wilde in Blumea 20: 237. 1972; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. 22 (1): 59. 1984.

草质藤本，茎细弱，无毛或变无毛，具条纹。叶革质，长2.5—3.5厘米，宽6—10厘米，上面橄榄绿色，光滑，下面微被白粉并密被细短柔毛，有6—8个腺体，基部截形或近圆形，顶端叉状2裂；裂片卵形，长5—7厘米，宽2.5—3.5厘米，先端急尖或钝尖；侧脉2—3对，网脉平行横出；叶柄长2—3厘米，被稀疏短柔毛，近基部具2个杯状腺体。花序近无柄，成对生于卷须两侧，有5—8朵花，被棕色柔毛；花梗长2—6毫米；花黄绿色，直径达1.5—2厘米；萼片5枚，长8—10毫米，被柔毛，外面顶端不具角状附属器；花瓣与萼片近似，长6—8毫米；外副花冠裂片2轮，线状，外轮裂片长3.5—4毫米，内轮裂片长1.5毫米；内副花冠褶状，高约1.5毫米；具花盘，高约0.4毫米；雌雄蕊柄长4—5毫米；雄蕊5枚，花丝长约3毫米，分离，花药长圆形，长约2.5毫米；子房无柄，卵球形，长约2毫米，无毛；花柱3枚，长约2.5毫米，分离。浆果球形，直径约1—1.2厘米；果梗纤细，长约1厘米，中部具关节；种子多数，三角状椭圆形，扁平，暗棕色，顶端具尖头。 花期4—5月，果期6—7月。

产广西西南部。生于海拔450米的山坡杂木林中。模式标本采自龙州。

11. 月叶西番莲 (云南植物志) 图版 23: 9

*Passiflora altilobata* Hemsl. in Kew Bull. 1908: 17. 1908; Dunn in Journ.



图版 24 1—6. 杯叶西番莲 *Passiflora cupiformis* Mast.: 1. 花枝; 2. 果形; 3. 萼片; 4. 花 (纵切); 5. 雌蕊、雄蕊及雌雄蕊柄; 6. 种子。7—8. 广东西番莲 *Passiflora kwangtungensis* Merr.: 7. 果枝; 8. 种子。9. 蝴蝶藤 *Passiflora papilio* Li, 9. 叶枝。(李锡畴绘)