

## 13. 菱叶西番莲 (植物分类学报)

*Passiflora rhombiformis* S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (L.): 60, t. 1. 1984.

多年生草质藤本，基纤细，无毛，具条纹。叶膜质，长1—1.5厘米，宽6—9厘米，先端2裂成横向菱形，基部圆形或近心形，全缘，侧脉2—3对，网脉纤细，下面显著，无毛，无腺体；具柄，长2—3厘米，中部以上有2枚小腺体。聚伞花序有2—3朵花；花梗纤细，长1.5—2厘米，无毛；花淡黄色，直径2—2.5厘米；萼片5枚，长圆形，外面顶端无角状附属器，无毛；花瓣5枚，倒披针形，长1—1.2厘米，外副花冠1轮，裂片圆柱形，纤细，顶端近头状，内副花冠直立，褶皱状，高约5毫米；雄蕊5枚，花丝扁平，长5—7毫米，花药长圆形；子房椭圆球形，无毛，花柱3枚，反折。果未见。花期4月。

产贵州。生于海拔1340米的山坡密林中。模式标本采自望漠。

组2. 无花瓣组 Sect. Cieca (Medik.) DC. in Prodr. **3**: 323. 1828.

总苞片缺或较小。花无花瓣，外副花冠裂片1—2轮，内副花冠褶皱状；花盘小或缺。叶全缘或2—3裂；叶柄具腺体。

本组有20余种，主产美洲。中国引进栽培1种。

## 14. 细柱西番莲 (云南植物志)

*Passiflora gracilis* Jacq. ex Link in Enum. Pl. **2**: 182. 1822; G. Cusset in Adansonia **7**: 380. 1967, in clavi.; 云南植物志 **1**: 50. 1977; S. Y. Bao in Acta Phytotax. Sin. **22** (1): 61. 1984.

一年生草质藤本，长约3—4米；茎细弱，四棱形，有纵条纹及白色糙伏毛。叶3浅裂，长5—5.5厘米，宽5—6厘米，基部心形，边缘有少数小尖齿，叶下面灰绿色，微被稀疏长柔毛；裂片卵形，先端钝圆并具小尖头；叶柄长达7厘米，被白色糙伏毛，从叶基部往下1厘米有2个头状腺体。花无苞片，单生或成对生于叶腋内，直径达2.5厘米，苍绿色或白色；萼片5枚，有紫红色斑纹，长6—8毫米，长圆形或披针形、密被短硬毛，在外面顶端具1枚细小的角状附属器，无花瓣；外副花冠裂片1轮，丝状，长约7毫米；内副花冠褶皱状，高约0.5毫米；无花盘；雌雄蕊柄长6—7毫米；雄蕊5枚，花丝扁平，分离，长约5毫米；花药长圆形，长约3毫米；子房近球形，密被白色柔毛；花柱3枚，近丝状，长7—8毫米，柱头近头状。浆果近球形，直径1—1.5厘米，成熟时紫黑色。花期6—7月。果期10月。

原产南美北部。栽培于云南的西双版纳或逸生于附近地区。

组3. 龙珠果组 Sect. Dysosmia DC. in Mém. Soc. Phys. Geneve. **1**: 435. 1822,