

侧楔形至近圆形，宽侧圆耳状，向下延伸长达8—13毫米，宽2.4—3厘米，边缘有浅而疏不等大的三角形之齿，齿尖常有短芒，上面深绿色，散生极疏硬毛，下面淡绿色，疏生短硬毛，通常掌状6条脉，窄侧2条，宽侧3条；叶柄长3—5厘米，无毛或近无毛；托叶膜质，披针形，长约5毫米，无毛，早落。花粉红色，常2朵，呈聚伞状，花序梗长2.5—5厘米，花梗长8—30毫米，均无毛；苞片膜质，长圆形，长3—4毫米，宽约1毫米，早落；雄花：花被片4，外轮2枚宽卵形，长约8毫米，宽约6毫米，先端圆，内轮2枚长圆形，长5—8毫米，宽3.5—4（—6）毫米；雄蕊多数，花丝离生，长1—1.5毫米，花药黄色，倒卵形，长约1毫米，药隔不伸出；雌花：花被片5，宽卵形至长圆形，5瓣不等大，先端圆或钝；子房倒卵长圆形，长约1毫米，宽约6毫米，无毛，3室，每室胎座具2裂片，具不等大3翅；花柱3，离生，柱头膨大，呈外向螺旋状扭曲。蒴果下垂，果梗长2.5—3厘米，无毛；轮廓长圆形，长约11毫米，直径8—9毫米，无毛，具不等大3翅，最大的呈镰刀状，长1.3—2厘米，宽约1厘米，无毛，有明显网脉，另2翅小，呈斜三角形，长5—7毫米，上方的边平，下方的边从上向下斜；种子极多数，小，长圆形，浅褐色，光滑。花期8月，果期9—10月。

产云南（绿春、文山）。生于南坡山坡地、芭蕉林下草丛中、山坡密林下阴湿处石缝中，海拔1750—1825米。模式标本采自绿春。

26. 溪头秋海棠（台湾植物志）

Begonia chitoensis Liu & Lai in Fl. Taiwan 3: 793, pl. 820, fig. 1—9. 1977; L. B. Smith et al. in Smithson. Contr. Bot. 60: 127, 129, in clavi, 150, pl. s, fig. 39. 1986.

草本。无毛或散生柔毛。茎粗壮，高45厘米，干时具沟，下部节间长约15厘米，上部节间长12厘米。叶具长柄；叶片两侧不相等，轮廓斜卵状圆形，长15—20厘米，宽10—15厘米，先端急尖或渐尖，基部心形，边缘有细齿，掌状8—9条脉；叶柄长10—12厘米，深红色；托叶卵形，长8—10毫米，先端渐尖。花淡粉色，少数，呈聚伞状，腋生；花序梗细弱，长约20厘米，有小苞片；雄花：花被片4，外面2枚大，宽卵形，长约1.5厘米，宽约2厘米，内面2枚小，长约1.5厘米，宽约8毫米；雄蕊多数，花丝离生，长约1.5毫米，花药长约1毫米；雌花：花被片5，外面的宽卵形；子房3室，具有不等3翅，花柱3，2裂，柱头外向螺旋状扭曲，并带刺状乳头。蒴果长约3厘米，直径1.5厘米，具不等3翅，1翅伸长，长约20毫米；宽约13毫米，其余2翅窄。花期6—10月。

产台湾（南投、溪头）。模式标本采自溪头。

该种未见标本。描述主要根据《台湾植物志》。

27. 鹿谷秋海棠（台湾植物志）

Begonia lukuana Liu & Ou in Bull. Exp. Forest Natl. Chung Hsing Univ. 4: 6.