

片4, 外轮2枚, 长圆形, 或宽卵形, 长约1.2厘米, 宽约1厘米, 先端圆钝, 内轮2枚, 倒卵形, 长约7毫米, 宽约5毫米, 先端圆; 雄蕊多数, 整个呈球状, 花丝离生, 花药近圆形, 长约0.8毫米; 雌花: 花被片3, 外轮2枚, 宽卵形, 长约8毫米, 长宽几相等, 先端圆或圆钝, 内轮花被片1, 长圆形, 长5—6毫米, 宽约4毫米, 先端圆; 子房长圆形, 3室, 每室胎座具2裂片, 花柱3, 柱头呈螺旋状扭曲。蒴果具3翅, 一翅特大, 呈镰刀状, 长约9毫米, 宽约0.6毫米, 另2翅短小, 呈新月形, 仅长约2毫米, 种子极多数, 小, 长圆形, 淡褐色, 光滑。

产广西(金秀、象州)。生于石山上, 海拔3000米。模式标本采自金秀。

本种外形很似独牛秋海棠 *B. henryi* Hemsl. 但以子房3室, 每室胎座裂片2, 而区别于后者。

39. 册亨秋海棠 (植物分类学报)

Begonia cchengensis Ku in Acta Phytotax. Sin. 33 (3): 254, fig. 3. 1995.

多年生草本。根状茎球形, 有时呈块状, 直径6—8毫米, 周围长出多数不等的细长之根。茎高10—16(—20)厘米, 柔弱, 有棱, 近无毛。基生叶通常1片, 有柄; 叶片纸质, 轮廓宽卵形或近圆形, 长7—8厘米, 宽约6厘米, 先端急尖, 基部稍偏斜, 呈宽圆形, 边缘有不等浅圆钝之齿, 上面绿色, 近无毛或散生极疏短硬毛, 下面黄绿色, 近无毛, 掌状7条脉, 两面均明显呈淡褐色; 叶柄长4—8厘米, 有明显棱, 近无毛; 托叶膜质, 早落。茎生叶1—2片, 长圆状卵形, 长约5厘米, 宽约2.4—2.9厘米, 先端短渐尖, 基部偏斜较明显, 边缘有浅而不等之齿, 两面均无毛; 叶柄长2—4厘米, 柔弱, 有棱, 无毛; 托叶早落。花白色, 2—4朵, 聚伞状, 腋生; 花序梗长3—5厘米, 花梗长4—10毫米, 均无毛; 苞片膜质, 披针形, 早落; 雄花: 花被片2, 半圆形, 长约8毫米, 宽约10毫米; 雄蕊多数, 花丝长约1毫米, 离生, 花药倒卵球形, 长约1毫米; 雌花: 花被片2, 两片不等大, 一片呈半圆形, 长约8毫米, 宽约10毫米, 先端圆, 基部楔形, 另一片宽卵形, 长约8毫米, 宽约6毫米, 先端圆; 子房倒卵球形, 顶端具长约3毫米之喙, 无毛, 3室, 中轴胎座, 每室胎座具2裂片; 花柱3, 离生, 柱头呈深U字形, 并带刺状乳头。蒴果下垂, 果梗长约5毫米, 无毛, 轮廓倒卵球形, 长5—7毫米, 无毛, 具3近等大之翅, 翅偏三角形, 长约5毫米, 无毛; 种子极多数, 小, 长圆形, 淡褐色, 平滑。花期8月开始, 果期9月开始。

产贵州(册亨)。海拔750米。模式标本采自册亨。

40. 匍地秋海棠 (植物分类学报)

Begonia ruboides C. M. Hu ex C. Y. Wu et Ku in Acta Phytotax. Sin. 33 (3): 260. fig. 9. 1995.

多年生草本。根状茎未见。茎匍伏, 多棱, 节处生根, 密被锈褐色长硬毛。叶互生, 具柄; 叶片轮廓略不相等, 近圆形或宽卵形, 长2.5—6厘米, 宽2—5厘米, 先端