

本种外形近似糙叶秋海棠 *B. asperifolia* Irmsch., 后者除雌花被片 5 之外, 其叶片较大, 轮廓宽卵形, 长 15—20 (—30) 厘米, 宽 11—18 (—20) 厘米, 边缘多为重锯齿, 花柱离生或仅基部合生而不相同。

60b. 窄檐心叶秋海棠 (变种)

var. *unialata* Ku in Acta Phytotax. Sin.

本变种的特点: 1 翅特大, 呈斜三角形, 长 1—1.5 厘米; 其余 2 翅退化消失或呈窄檐状。果期 9 月开始。

产云南 (福贡)。生于海拔 1600 米的林下。模式标本采自福贡 (上帕)。

61. 景洪秋海棠

Begonia discreta Craib in Kew Bull. 1930: 410. 1930; L. B. Smith et al. in Smithson. Contr. Bot. 60: 23, 25, in clavi, 159, 341, pl. 8, fig. 5. 1986. — *B. labordei* auct. non Lévl.: Yü in Bull. Fan Mem. Biology new ser. 1 (2): 115. 1948, p. p. min. quoad C. W. Wang 79447.

无茎小草本。根状茎块状, 直径约 7 毫米, 周围生出纤维状之根。叶均基生, 具长柄; 叶片两侧略不相等, 轮廓长圆形、长圆状卵形, 或近方形, 长 4.5—13 厘米, 宽 3.5—9 厘米, 先端渐尖或急尖, 基部略偏斜, 心形, 边缘有不等大远离的浅齿, 上面散生极疏带褐色短毛或近无毛, 下面沿脉有散生带褐色疏毛, 两面均带红绿色, 掌状 7 (—9) 条脉, 中部以上呈羽状, 小脉不明显, 上面下陷, 下面突起; 叶柄长 3—8.5 厘米, 柔弱, 近上部或近顶端稍被极疏之毛; 托叶早落。花葶高 3.5—7 厘米, 有棱, 近无毛; 花白色, 2—4 (?) 朵, 呈二歧聚伞状, 花梗长 5—10 毫米, 细弱, 近无毛; 苞片早落; 雄花: 花被片 4, 外面 2 枚近椭圆形, 长约 11 毫米, 宽约 7 毫米, 外面微被较长毛, 内面 2 枚, 长圆倒披针形, 长约 10 毫米, 宽约 2.5 毫米, 无毛; 雄蕊约 12, 花丝基部合生, 小部分离生, 花药长约 1 毫米, 药隔不伸出; 雌花: 花被片类似雄花的花被片, 但稍小, 几无毛; 子房 3 室, 每室胎座具 2 裂片, 花柱 3, 长约 2 毫米, 约 $\frac{1}{2}$ 之下部合生, 柱头半新月形, 不扭曲。蒴果下垂, 果梗长约 1.1 厘米, 细弱, 无毛, 轮廓倒长卵球形, 长约 6 毫米, 直径约 5 毫米, 无毛, 具不等 3 翅, 大的斜三角形, 长约 7 毫米, 宽约 5 毫米, 无毛, 有纵纹, 其余 2 翅极窄; 种子极多数。花期 9—10 月。果期 10 月开始。

产云南 (景洪南线河)。生于海拔 800 米的灌丛下。泰国也有。模式标本采自泰国清迈。

62. 紫背天葵 (广东肇庆、从化) 天葵 (广东梅县、怀集)

Begonia fimbristipula Hance in Journ. Bot. 21: 202. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 321. 1887; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 10: