

2—2.5 厘米，轮廓长圆形，长 8—12 毫米，直径 4—5 毫米，2 室，每室胎座具 2 裂片，具不等 3 翅，大的长圆形或窄舌形，长 11—13 毫米，直径约 5 毫米，先端圆钝，上方的边斜，其余 2 翅三角形，长 6—8 毫米，上方的边截形。下方的边斜。果期 8 月开始。

产云南（腾冲和大理之间）（即模式产地）。

本种以根状茎长匍匐，节间长可达 1.5—5 厘米，节处匍地生根，密被锈褐色长毛；叶基生，具长柄。而易于识别。

112. 澄迈秋海棠（植物分类学报）

Begonia chuniana C. Y. Wu in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 267, fig. 13. 1995.

多年生草本。高 15—20 厘米。根状茎伸长，斜出，横走，节处被残存膜质褐色的鳞片，周围生出多数细长纤维状之根。叶均基生，具长柄；叶片两侧不相等，轮廓卵状披针形，长 6—11 厘米，宽 3.5—5 厘米，先端渐尖，基部心形，窄侧呈圆形，宽侧延伸呈长圆形，长达 2—3 厘米，边缘有浅而疏带短芒三角形之齿，上面深绿色，近无毛，下面浅绿色，散生短硬毛，沿脉较密，叶脉在两面明显突起；叶柄长 5—9 厘米，被褐色卷曲毛；托叶膜质，卵状披针形，长约 10 毫米，宽约 5 毫米，先端渐尖，早落。花萼高 8—10.8 厘米，疏被短毛或近于无毛，花白色或黄色；雄花：数目较多可达 8 朵，呈圆锥状，长 7—10 厘米；苞片和小苞片膜质，披针形，长 8—10 毫米，先端渐尖，边常有疏齿；花梗长 1.5—1.8 厘米，花被片 4，外轮 2 枚大，长卵形至长方形，长 15—17 毫米，宽 10—13 毫米，先端圆，内轮 2 枚小，长圆形，长 4—5 毫米，宽 2—3 毫米，先端圆钝；雄蕊多数，花丝长 1.5—2.5 毫米，离生，花药长圆形或倒卵长圆形，黄色，长约 1.5 毫米，药隔不明显；雌花：花数目较少，通常 2—4 朵，苞片和小苞片膜质，披针形，长 6—9 毫米，宽 2—3.5 毫米，先端渐尖，早落；花梗长 1.5—2.5 厘米，被腺毛；花被片 4，外轮 2 枚宽卵形，长 10—12 毫米，宽 8—9 毫米，先端圆或钝，内轮 2 枚长圆形，长 7—8 毫米，宽 3—4 毫米，先端钝；子房 2 室，每室胎座具 2 裂片；花柱 2，柱头分裂并呈外向螺旋状扭曲，带刺状乳突。蒴果具略不等大 3 翅，2 窄翅近等大；种子多数，长圆形，长约 0.5 毫米，浅褐色，光滑。花期 3—4 月，果期 4 月开始。

海南（澄迈、白沙）。生于林下。模式标本采自澄迈。

113. 厚叶秋海棠（云南种子植物名录） 红八角莲（云南种子植物名录）

Begonia dryadis Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. **21** (1): 41. 1951; C. Y. Wu et al. Index Fl. Yunnan. **1**: 349. 1984; L. B. Smith et al. Smithsonian. Contr. Bot. **60**: 120, in clavi, 160, pl. 32, fig. 29. 1986. —*Begonia dawuishanensis* S. H. Huang et Shui in Acta Bot. Yunnan. **16** (1): 337, fig. 5. 1994.

多年生草本，高 5—10（—17）厘米。根状茎伸长，横走，圆柱状，表面不平整，