

形至近圆形，长 12—17.5 毫米，宽 10—16 毫米，有时宽过于长，先端钝，外面有较长卷曲毛和细疏柔毛，内面的窄，倒卵形或长圆形，长 13—20 毫米，宽 9—12 毫米，无毛；子房倒卵形或卵球形，长 8—11 毫米，宽 7—10 毫米，基部微凹，散生卷曲长柔毛，2 室，每室胎座具 2 裂片，具不等 3 翅，花柱 2，短，长 4—6 毫米，近离生或仅基部合生，约在 $\frac{1}{2}$ 的部位分枝，柱头向外螺旋状或环状扭曲，并带刺状乳突。蒴果下垂，果梗长 3.7 毫米，轮廓斜倒卵球形或长圆形，长 8—10 毫米，有不等 3 翅，大的近舌状，长 12—15 毫米，直径 11—16 毫米，其余 2 翅窄，以长度的面贴生于果上；种子极多数，小，长圆形，淡褐色。花期 4—5 月，果期 7 月开始。

产云南（腾冲、盈江、德宏一带）。生于山坡阴湿处岩石上或阴湿峡谷石上或峭壁上，海拔 1200—2600 米。模式标本采自腾冲。

132. 瓜叶秋海棠（植物分类学报）

Begonia cucurbitifolia C. Y. Wu in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 268, fig. 14. 1995.

多年生草本。根状茎粗大，横走，圆柱形，直径 8—11 毫米，略似念珠状，节处生出多数细长之根。茎极短缩，高约 4 厘米，有棱，无毛。基生叶 3 枚，近革质，具长柄；叶片轮廓近圆形，长 14—16.2 厘米，宽 14—16 厘米，先端渐尖至尾尖，基部浅心形至近圆形，边缘有极疏浅齿，并 3（—4）中裂或略超过，中间裂片长圆披针形，长 9—10.5 厘米，宽 4.5—5.5 厘米，先端渐尖，两侧裂片卵状长圆形，长 5—8.5 厘米，宽 4—6 厘米，上面深绿色，下面淡绿色，两面均近无毛，掌状 3—4 条脉，二回叶脉为羽状脉；叶柄长 22—26 厘米，有密棱，无毛；托叶膜质，披针形，长约 12 毫米，早落。茎生叶与基生叶同形，仅叶柄稍短，叶柄长约 16 厘米。花葶高约 27 厘米，干时有棱，近无毛；花白色，通常 4 朵，呈二回二歧状，分枝长约 25 毫米；花梗长约 15 毫米，均无毛；苞片早落；雄花：花被片 4，外轮 2 枚大，长卵形或三角状卵形，长约 25 毫米，宽约 13 毫米，先端钝，内轮花被片 2，较小，长圆形，长约 15 毫米，宽约 5 毫米，先端突尖；雌花未见。蒴果下垂，大，粗壮，果梗长约 3 厘米，无毛；轮廓椭圆形，长约 17 毫米，直径约 8 毫米，无毛，2 室，每室胎座具 2 裂片，具 3 不等大之翅，一个特大，呈卵状长圆形，长约 17 毫米，宽约 14 毫米，先端宽而圆，无毛，有明显之脉，另 2 翅近等大，呈新月形，长 5—7 毫米，先端圆，无毛；种子极多数，小，长圆形，淡褐色，光滑。花期 8 月，果期 3 月。

产云南（河口）。生于密林下岩石上和石灰岩山地以及山谷密林下阴处，海拔 430 米。模式标本采自马家河。

133. 少裂秋海棠（植物分类学报）

Begonia paucilobata C. Y. Wu in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 275, fig. 20.

1995.

133a. 少裂秋海棠 (原变种)

var. *paucilobata*

多年生草本，高约 30 厘米。根状茎粗壮，圆柱形，直径约 1.5 厘米，斜出，节处生出多数细长不等之根。叶均基生，具长柄；叶片轮廓宽卵形或五角形，长 7—10 厘米，宽 6.5—9 厘米，先端尾尖，基部浅心形至心形，边缘具浅而疏并带短芒之锐齿，通常 5 中裂或略超过中裂，中央裂片较长，呈斜卵形，两侧裂片较短，斜卵形，基部 2 裂片最短，呈宽卵形，先端急尖，上面褐绿色，被极疏短硬毛，下面淡绿色，近无毛或沿脉被短柔毛，掌状 5 出脉，下面明显；叶柄长 11—14.5 厘米，近无毛；托叶膜质，早落。雌雄花均未见。果萼高 19—22.2 厘米，有棱，近无毛，果序呈聚伞状；蒴果下垂，梗长 1.8—2.1 厘米，有棱，近无毛；轮廓椭圆形，长约 1.5 厘米，具不等大 3 翅，1 翅特大，呈长方形，长 1.3—1.5 厘米，宽 9—13 毫米，顶端方而圆，有明显脉纹，另 2 个亦不等大，斜半圆形；2 室，每室胎座具 2 裂片；种子极多数，小，长圆形，淡褐色，光滑。果期 10 月。

产云南 (绥江)。生于林下，海拔 1700 米。模式标本采自绥江。

133b. 马关秋海棠 (变种) (云南植物研究)

var. *maguanensis* (S. H. Huang et Shui) Ku, stat. nov. — *B. maguanensis* S. H. Huang et Shui in Acta Bot. Yunnan. 16 (1): 338, fig. 6. 1994.

本变种与原变种的区别为幼果和花被片外面均被密毛而不同。

产云南 (马关) (即模式产地)。生于海拔 1760 米。

作者未见该种的花期标本，根据见到的果期标本，外形极似少裂秋海棠 (*B. paucilobata* C. Y. Wu)，花被片未见，果实近于无毛。但又根据新种图版所示，幼果和花被片外面均密被毛。所以暂作变种保留。

134. 美丽秋海棠 (中国高等植物图鉴) 裂叶秋海棠、虎爪龙

Begonia algaia L. B. Smith et D. C. Wasshausen in Phytologia 52: 441. 1981; L. B. Smith et al. in Smithson. Contr. Bot. 60: 19, in clavi, 137, pl. 5, fig. 29. 1986. — *B. calophylla* Irmsch. in Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 6: 351. 1927, et 10: 540. 1939; et in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (2): 385. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 940, 图 3610. 1972, non Gilg ex Engl. 1921.

多年生柔弱草本。根状茎长 4—11 厘米，直径 5—8 毫米，红褐色，粗糙，节密，生出多数长短不等的纤维状之根。茎短缩。基生叶具长柄；叶片轮廓宽卵形至长圆形，长 10—20 厘米，宽 9—19 (—21) 厘米，先端尾状长渐尖或长渐尖，基部心形至深心形略偏斜，全边具疏而大小不等的三角形浅齿，齿尖带短芒，通常 6 (—8) 中裂或略过之，中间 3 裂片再中裂，裂片披针形至卵状披针形，基部楔形，下部两侧裂片通常再