

钩枝藤科 ANCISTROCLADACEAE

藤本，无毛。枝具环状钩。单叶互生，常聚于枝顶，全缘，通常无柄；托叶小，早落。花小，两性，辐射对称，呈顶生或侧生二歧状分枝地圆锥状穗状花序；苞片小；萼筒短和子房下部合生；萼片5，覆瓦状排列，果时增大呈翅状，翅不等大；花瓣5，基部稍合生；雄蕊5或10，花丝不等长，花药通常2室，基底着生，内向，纵裂；子房大部下位，3心皮，1室，具有1侧生或基生胚珠；花柱粗厚，球形或长圆形，柱头3。果为坚果，由增大的萼筒所包被；种子1，近球形，外种皮革质，种皮薄；胚短，直立，子叶略叉开，胚乳肉质。

1属，约20余种；分布亚、非大陆热带地区。

1. 钩枝藤属 *Ancistrocladus* Wall. ex Arnott.

Wall. (Cat. 1052. 1832) ex Arnott in Nov. Act. **18**: 325. 1836; nom. conserv. Planch. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, **13**: 316. 1849; Scheff in Nat. Tijd. N. **1**, **32**: 407. 1873; Van Steen. Fl. Malesiana ser. 1, **4** (1): 9. 1948. — *Bembix* Lour. Fl. Cochinch **1**: 282. 1790. — *Wormia* Vahl, Skrift. Nat. Selsk. Kjobenh. **6**: 104. 1810, non Rottb. — *Bigamea* Koen ex Endl. Gen. Pl. 1183. 1840.

属的特征与科相同。

本属约20余种，分布亚、非大陆热带地区。我国有1种，仅见于海南。

属名模式：*A. hamatus* (Vahl) Gilg (*Wormia hamata* Vahl)

1. 钩枝藤（海南植物志） 本蓬藤、本叶藤（海南）

Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr. in Lingn. Sci. Journ. **6**: 329. 1930; Van Steen. Fl. Malesiana ser. 1, **4** (1): 9, fig. 1, 2. 1948; 海南植物志 **1**: 515, 图 283. 1964; 中国高等植物图鉴 **2**: 946, 图 3621. 1972. — *Bembix tectoria* Lour. Fl. Cochinch. **1**: 282. 1790. — *Ancistrocladus pinangianus* (Wall. Cat. 1054 nomen) Planch. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, **13**: 318. 1849; A. DC. Prodr. **16** (2): 603. 1868; Dyer in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 300. 1874. — *A. extensus* Wall (Cat. No. 1052. 1828) nom. nud. Plantch. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3,