

鉴 2: 957, 图 3644. 1972.

灌木, 高 0.5—1.5 米; 幼枝纤细, 圆柱形, 密被灰白色绢状糙伏毛, 越年生小枝褐色, 毛被逐渐变稀疏而近于无毛; 芽近圆形, 被白色绒毛。叶坚纸质至薄纸质, 互生, 椭圆形、窄长圆形或倒披针状长圆形, 长 1—4 厘米, 宽 0.4—1.5 厘米, 先端钝或微尖, 基部宽楔形或近钝圆, 两面均被灰白色柔毛, 后渐变为少毛或近无毛, 上面绿色, 下面略苍白色, 侧脉每边 4—6 条, 在上面不明显, 在下面与网脉均明显, 中肋在下面稍凸出; 叶柄短, 长约 1.5 毫米, 被短柔毛。花黄色, 无柄或具短柄, 组成顶生或腋生单生、少花或多花的具短花序梗的头状或穗状花序; 花序梗长 1—5 毫米, 被绢状平伏毛, 花序短于叶、等于叶或稍长于叶; 花萼长约 6—11 毫米, 被紧贴的绢状柔毛, 裂片 4, 先端钝, 微啮蚀状, 比花萼管短 4—5 倍; 雄蕊 8, 2 列, 上列 4 枚着生于花萼管喉部, 下列 4 枚着生于花萼管中部, 花药长圆形, 约长 1 毫米, 花丝极短, 花盘鳞片长方形或正方形, 先端具不规则的小齿, 或线状披针形; 子房窄长圆形, 密被平贴短柔毛, 花柱极短, 柱头头状。果红色。 花期秋季。

产四川, 其他云南 (仅见于德钦一地)、河北、陕西、山西也有。常见于海拔 1900—2700 米的林边阴处或山坡灌丛中。模式标本采自四川西部的懋功 (即小金县)。

29. 丽江堇花 醉鱼草 (云南德钦) 图版 50: 7—8


Wikstroemia lichiangensis W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 136. 1913; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 586. 1933.

灌木, 高 1.5—3 米, 多分枝; 幼枝圆柱形, 密被灰白色绒毛, 渐老渐变为无毛, 小枝灰黑色具皱条纹, 被丝状毛。叶互生, 纸质全缘, 边缘稍反卷, 倒披针形或长圆形, 长 1.5—3 厘米, 宽 0.5—1 厘米, 先端圆或钝, 基部宽楔形, 上面绿色, 被分散的灰白色小疏柔毛, 下面淡绿色, 被分散的小疏柔毛, 侧脉每边 4—5 条, 在上面不明显, 在下面与网脉均明显。头状花序具 5—15 朵花, 顶生或生于分枝的顶端, 花序梗长 5—10 毫米, 被灰白色绒毛; 花黄绿色, 长约 1.2 厘米; 花萼长约 1 厘米, 径约 1 毫米, 外面密被灰白色绒毛, 裂片 4, 近圆形, 长约 2 毫米, 外面被绒毛, 内面无毛; 雄蕊 8, 2 列, 上列在花萼管喉部着生, 下列在花萼管中部稍上着生, 花药长圆形, 约长 1 毫米, 花丝长约 0.3 毫米, 花盘鳞片 1 枚, 线形, 顶端有时 3 裂, 长约为子房之半; 子房倒卵形, 具柄, 长约 2 毫米, 密被长柔毛, 花柱短, 柱头头状, 顶基压扁。果窄卵形, 包藏于残存花萼之内, 具短柄。 花期夏秋。

产云南西北部、四川西南部。常见于海拔 2600—3500 米的杂木林下、松林中、荒地灌丛及路边。模式标本采自云南丽江。

30. 隆子堇花 图版 50: 1—3

Wikstroemia lungtzeensis S. C. Huang in Acta Bot. Yunnan. 7 (3): 285, fig. 7. 1985; 西藏植物志 3: 326, pl. 134, fig. 5—7. 1986.



图版 50 1—3. 隆子堇花 *Wikstroemia lungtzeensis* S. C. Huang: 1. 花枝; 2. 花纵剖; 3. 花序及叶放大。4—6. 白马山堇花 *Wikstroemia baimashanensis* S. C. Huang: 4. 花枝; 5. 花纵剖; 6. 幼茎及叶放大。7—8. 丽江堇花 *Wikstroemia lichiangensis* W. W. Smith: 7. 花枝 (部分); 8. 花纵剖。(李锡畴绘)