

下衬以 2 小叶，以后成为短穗状花序，小花梗短，与花连接处具关节，花黄色，长约 0.8—0.9 厘米，在开花时花的长短差异很大，外面被灰白色柔毛，顶端 4 裂，裂片长圆形，端钝，长约 1—1.5 毫米；雄蕊 8，长约 1 毫米，二列，上列在花萼管喉部着生，下列在花萼管中部以上着生，子房无柄，椭圆形，长约 1.5—2 毫米，被绢状柔毛，花柱短，为柔毛所盖覆，柱头圆球形，具乳突；花盘鳞片 1 枚，线状披针形，长方形或正方形，尖端具不规则的齿。果干燥。花期秋季。

产西藏东部、四川北部、云南西北部。生于海拔 2200—3800 米的干热河谷及山坡灌丛中。模式标本采自云南德钦。

本种与 *W. lichiangensis* W. W. Smith 及 *W. canescens* Meisn. 相似，唯花萼管较短（0.8—0.9 厘米）在开花时花萼管间的长度相差很大。

33. 澜沧堇花 图版 51: 3—4

Wikstroemia delavayi Lecomte in Not. Syst. 3: 129. 1915; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 586. 1933. — *W. mekongensis* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 12: 229. 1920, ex auct. descr., syn. nov.


灌木，高 1—2 米，直立；多分枝，小枝幼时近圆形，黄绿色，无毛。叶对生，茎下部的叶较大，近花序部分的叶较小，无毛，披针状倒卵形、倒卵形或倒披针形，长 3—5.5 厘米，宽 1.6—2.5 厘米，先端圆具短而微钝的小尖头或短渐尖及锐尖，基部圆形或微心形，侧脉约 5 对，细而无光，极倾斜，上面绿色，下面苍白色。圆锥花序顶生，长 3—4 厘米，有时延伸到 10 厘米；花序梗无毛，花梗长约 1 毫米，具关节；花黄绿色，常在顶端呈紫色，约长 8—10 毫米，宽 1 毫米，被散生的小疏柔毛，裂片 4，长圆形，约长 2 毫米；雄蕊 8，2 列，花药线状长圆形，长约 1 毫米，花丝短；子房倒卵形，有柄，顶端具疏柔毛，长约 2.5 毫米，花柱短，柱头头状；花盘鳞片 1—2 枚或 1 枚，在顶端 2 裂。干果圆柱形，长约 4 毫米，径约 1.2 毫米。秋季开花，随即结果。

产云南及四川。生于海拔 2000—2700 米的河边、林中、山坡灌丛或河谷石灰岩山地。模式标本采自洱源。

34. 匙叶堇花（云南植物研究） 图版 52: 4—6

Wikstroemia cochlearifolia S. C. Huang in Acta Bot. Yunnan. 7 (3): 290, fig. 11. 1985.

灌木，高 0.5 米；幼枝密被灰色柔毛，隔年生枝黑色，毛被逐渐脱落至近于无毛。叶互生，少数近对生，椭圆形至倒披针状匙形，长 1—2 厘米，宽 2—5 毫米，先端锐尖，基部渐狭，上面无毛，下面密被平贴长柔毛，脉不明显；叶柄短，近于无。头状花序顶生或 1 至数花生于近枝顶叶腋内或簇生于侧生短枝的顶端。花亮乳酪黄色，长约 8 毫米，外面被柔毛，顶端 4 裂，裂片 2 大 2 小，顶端圆；雄蕊 8，二列，上列 4 枚着生于花萼筒喉部，下列 4 枚着生于花萼筒中部以上；子房倒锥形，被毛，长约 2 毫米，花



图版 51 1—2. 澜沧堇花 *Wikstroemia scytophylla* Diels: 1. 花枝; 2. 花纵剖面。3—4. 澜沧堇花 *Wikstroemia delavayi* Lecomte: 3. 花枝; 4. 花纵剖面。5—6. 金丝桃堇花 *Wikstroemia lamatsoensis* Harnaya: 5. 花枝; 6. 花纵剖面。(杨建昆绘)