

柱短，隐藏于毛内，柱头球形，花盘鳞片4枚，小，线形。未成熟果椭圆形，为萎残的花萼所包被。花期秋季。

仅见于四川北部的剑阁、江油等地。生于海拔1200米左右的崖柏(Thuja)林下。模式标本采自四川江油。

与 *W. pampaninii* Rehd. 相近似，唯幼枝密被灰色柔毛，叶仅在下面被平贴长柔毛，花盘鳞片线形，4枚而不同。

35. 河朔莢花 (中国树木分类学) 矮雁皮 (秦岭)，羊仄仄 (陕北)，拐拐花 (陕西华县)，岳彦花 (陕西合阳)，羊燕花 (河南灵宝)，番瀉叶 (药用名)，老虎麻 (中国经济植物志)

*Wikstroemia chamaedaphne* Meisn. in DC. Prodr. 14: 547. 1857; Franch. Pl. David. 260; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 397. 1894; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 536. 1916; in Journ. Arn. Arb. 9: 96. 1928; 中国高等植物图鉴 2: 954, 图 3638. 1972.

灌木，高约1米，分枝多而纤细，无毛；幼枝近四棱形，绿色，后变为褐色。叶对生，无毛，近革质，披针形，长2.5—5.5厘米，宽0.2—1厘米，先端尖，基部楔形，上面绿色，干后稍皱缩，下面灰绿色，光滑，侧脉每边7—8条，不明显；叶柄极短，近于无。花黄色，花序穗状或由穗状花序组成的圆锥花序，顶生或腋生，密被灰色短柔毛；花梗极短，具关节，花后残留；花萼长约8—10毫米，外面被灰色绢状短柔毛，裂片4，2大2小，卵形至长圆形，端圆，约等于花萼长的1/3；雄蕊8，2列，着生于花萼筒的中部以上；花药长圆形，长约1毫米，花丝短，近于无；子房棒状，具柄，顶部被短柔毛，花柱短，柱头圆珠形，顶基稍压扁，具乳突；花盘鳞片1枚，线状披针形，端钝，约长0.8毫米。果卵形，干燥。花期6—8月，果期9月。

产河北、河南、山西、陕西、甘肃、四川、湖北、江苏等省。生于海拔500—1900米的山坡及路旁。蒙古也有分布。模式标本采自我国北方。

纤维可造纸，作人造棉，茎叶可作土农药毒杀害虫。

另有唐昌林1709号标本(采集地不详)的花序特长，叶脉较明显，而河北内丘刘鑫源642号标本的花稀疏，毛被较薄，花梗长约4毫米或均为变种，但因掌握的标本不多，尚不能断定。

36. 轮叶莢花 窄叶莢花 (中国高等植物图鉴) 图版 52: 7

*Wikstroemia stenophylla* E. Pritz. ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 480. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 530. 1916; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 586. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 961; 图 3651. 1972. — *W. chamaedaphne* Meisn. var. *galioides* Batal. ex Lecomte in Not. Syst. 3: 130. 1915. — *W. rosmarinifolia* H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 441. 1922; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 586. 1933.