

管状，长6—7毫米，直径1毫米，外面疏生淡黄色细柔毛，裂片5，长圆形，长4—5毫米，顶端钝形或圆形，无毛，干燥后脉纹显著；雄蕊10，2轮，分别着生于花萼筒的中部和喉部，花丝短，花药线状长圆形，长约1毫米，不伸出喉部；花盘一侧发达，倒卵状三角形；子房瓶状，长约2毫米，仅在顶端具淡黄色短绒毛，花柱短，长约0.5毫米，柱头球形。果实未见。花期5月，果期不详。

产山西、陕西。模式标本采自陕西西南部。

本种为落叶矮小灌木，小枝自基部发出；叶片倒卵形或广椭圆形，长1—3厘米，宽0.5—1.6厘米，下面粉绿色；花盘一侧发达，倒卵状三角形，子房瓶状，顶端被短绒毛，易于认识。

14. 细花瑞香（中国高等植物图鉴补编）

Daphne tenuiflora Bur. et Franch. in Journ. de Bot. **5**: 151. 1891; Nitsche, Beitr. Kenntn. Daphne 29. 1907; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 549, 1916; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 549, 图 8917. 1983. p. p. ——*Stellera tenuiflora* (Bur. et Franch.) Lecomte in Not. Syst. **3**: 209. 1916. ——*Wikstroemia tenuiflora* (Bur. et Franch.) Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **11**: 362. 1932.

14a. 细花瑞香（原变种） 图版 59: 5—8

var. *tenuiflora*

常绿直立灌木，高30—70厘米；枝纤细而伸长，分枝少，当年生枝黄绿色或黄褐色，散生黄色或黄绿色长柔毛，圆柱形，一年生枝灰褐色，柔毛脱落，多年生枝灰色或暗灰色，无毛，叶迹稀疏，显著；冬芽卵形或近椭圆形，细小，密被黄色绒毛。叶互生，膜质或薄纸质，披针形或长的长圆状椭圆形，长2—5厘米，宽0.4—1.2厘米，先端钝形或圆形，常具短尖头，基部窄楔形，边缘全缘，微反卷，上面深绿色，下面淡绿色，两面均无毛，有时下面幼时微具丝状毛，中脉在上面扁平，下面微隆起，侧脉5—8对，纤细，在两面不显著或微明显；叶柄长1—1.5毫米。花淡黄色，芳香，数朵簇生于小枝顶端成短总状花序；无苞片；花梗长1.5毫米，散生灰色短柔毛；花萼筒细瘦，长管状，无毛，长10—12毫米，直径1.2毫米，脉纹明显，裂片5，卵形至卵状披针形或长圆形，长3—5毫米，顶端钝形或钝圆形，边缘通常具缺刻，脉纹显著；雄蕊10，2轮，下轮着生于花萼筒中部以上，上轮着生于花萼筒喉部以下，约为花萼筒的3/4，花丝短，花药长圆形，长约1.6毫米，花盘一侧发达，鳞片状，长方形，深裂达1/2；子房狭卵形，具柄，顶端具淡黄色绒毛，花柱长0.7毫米，柱头头状。果实未见。花期5—6月，果期不详。

产四川西南部、云南西北部。生于海拔2700—3500米的灌木丛中或林缘。模式标本采自四川康定（打箭炉）。

本种小枝纤细；叶片披针形或长的长圆状椭圆形，有时下面微具白色丝状毛；花萼