

筒细瘦，子房狭卵形，具柄，花柱长 0.7 毫米，易于与本属其他种相区别。

14b. 毛细花瑞香 (变种) (新拟)

var. **legendrei** (Lecomte) Hamaya in Acta Hort. Goteburg. **26**: 83. 1963. —
Stellera tenuiflora (Bur. et Franch.) Lecomte var. *legendrei* Lecomte in Not. Syst. **3**:
209. 1916. — *Wikstroemia tenuiflora* (Bur. et Franch.) Domke var. *legendrei*
(Lecomte) Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **11**: 362. 1932.

与原变种的主要区别在于本变种的花萼筒的外面被少数贴生的短柔毛。

产四川西南部雅砻江下游海拔 3300 米左右的地区。

15. 雷山瑞香 (植物研究) 图版 60: 1—3

Daphne leishanensis H. F. Zhou ex C. Y. Chang in Bull. Bot. Res. **5** (3): 90.
1985.

落叶直立灌木，高约 50 厘米；枝纤细，伸长，当年生枝淡褐色，被灰白色丝状纤毛，多年生枝紫黑色，无毛，圆柱形；冬芽卵形，密被灰白色丝状毛。叶互生，膜质，稀薄纸质，椭圆形，稀椭圆状披针形，长 3.5—6.5 厘米，宽 1.2—2.5 厘米，先端急尖或短渐尖，基部钝圆形，不下延，稀微下延成宽楔形，边缘全缘，不反卷，上面无毛，绿色，下面淡绿色，幼时散生灰白色丝状纤毛，成熟后无毛，侧脉 6—8 对，与中脉在两面扁平或稍明显，或中脉在上面稍凹下；叶柄长 1.2—2.3 毫米，具灰白色丝状纤毛。花粉红白色，3—5 朵组成侧生的伞形状头状花序；无苞片；花序梗长约 2 毫米，与长 1—2 毫米的花梗密被灰白色纤毛；花萼筒圆筒状，长 6—7 毫米，外面散生灰白色丝状纤毛，裂片 4，宽卵形，长 2.5—3 毫米，宽约 2 毫米，顶端钝圆形；雄蕊 8，2 轮，下轮着生于花萼筒的中部，上轮着生于花萼筒的喉部，花药 $3/4$ 伸出外，花丝长 0.5 毫米，花药长椭圆形，长约 1 毫米；花盘基部盘状微合生，顶端大小不等的齿裂，裂片钝形；子房长卵形或窄椭圆形，长 1.2 毫米，顶端密被灰色纤毛，花柱短，柱头头状，表面多细粒状突起。果实未见。花期 5—6 月，果期不详。

产贵州 (雷山)。生于海拔 1110 米的河谷地带。模式标本采自贵州雷山 (小水岩)。

本种与芫花 *D. genkwa* Sieb. et Zucc. 相近，但不同之处在于多年生枝紫黑色；花粉红白色，花萼筒长 6—7 毫米，裂片长 2.5—3 毫米，花盘顶端齿裂，子房顶端具灰色纤毛。

16. 长瓣瑞香 (中国高等植物图鉴) 山地瑞香 (云南) 图版 60: 4—9

Daphne longilobata (Lecomte) Turrill in Curtis' s Bot. Mag. **172**: t. 344.
1959. — *D. altaica* Pall. var. *longilobata* Lecomte in Not. Syst. **3**: 217. 1916;
中国高等植物图鉴 2: 949, 图 3627. 1972; 西藏植物志 3: 321, 图版 132: 4—5.
1986.

常绿灌木，高约 1 米；枝纤细，不规则分枝，幼枝淡褐色，具灰黄色短柔毛，圆柱



图版 60 1—3. 雷山瑞香 *Daphne leishanensis* H. F. Zhou ex C. Y. Chang: 1. 花; 2. 花纵剖面; 3. 子房。4—9. 长瓣瑞香 *Daphne longilobata* (Lecomte) Turrill: 4. 花枝; 5. 小枝一段示毛被; 6. 花纵剖面; 7. 雄蕊; 8. 子房; 9. 果实。(冯先洁绘)