

0.8 毫米, 子房无柄或极短, 无毛, 长圆状锥形, 长 2.5 毫米, 花柱短, 长 0.5 毫米, 柱头膨大, 头状, 直径约 1 毫米, 几平滑或微具乳状突起。果实卵形, 长约 5 毫米, 花柱通常宿存。花期 8 月, 果期次年 2—3 月。

产云南西部; 生于海拔 2000—3200 米的山麓阴湿的林缘。模式标本采自云南漾濞。

本种显著的特征是当年生枝具条纹, 密被黄绿色粗绒毛; 叶片披针形至窄椭圆形, 上面微具光泽, 侧脉 7—8 对, 在上面微下凹; 花白色, 少花的头状花序顶生, 无苞片, 花萼裂片顶端渐尖, 花药长 2.1 毫米, 子房无毛, 花柱长 0.5 毫米, 可与本属的其他种相区别。

18. 紫花瑞香 (云南植物研究)

Daphne purpurascens S. C. Huang in Acta Bot. Yunnan. 7 (3): 280, fig. 3. 1985; 西藏植物志 3: 321, 图版 132: 1—3. 1986.

常绿直立灌木, 高 1.5—2 米; 幼枝灰绿色, 密被小纤毛, 老时渐脱落, 无毛。叶互生, 纸质, 长圆状椭圆形或长圆状披针形, 长 4—6.5 厘米, 宽 1—1.7 厘米, 先端渐尖, 尖头钝形或圆形, 有时微凹下, 具一簇白色绒毛, 基部钝形或钝圆形, 边缘全缘, 上面鲜时绿色, 干燥后暗褐色, 下面淡绿色, 两面均无毛, 中脉在上面凹下, 下面隆起, 侧脉 5—7 对, 在上面明显凹下或不甚明显, 下面稍隆起; 叶柄宽扁, 长 2 毫米, 无毛。花紫红色, 5—9 花组成顶生头状花序; 无苞片; 花序梗长 7 毫米, 密被淡黄白色糙伏毛, 花梗短, 密被糙伏毛; 花萼筒圆筒状, 长约 4 毫米, 具 8 条纵脉, 外面被淡白色丝状毛, 裂片 4, 卵状长圆形, 长 4—5 毫米, 宽 2—2.5 毫米, 顶端钝圆形, 尖头微凹下, 具 1 簇灰白色柔毛; 雄蕊 8, 2 轮, 下轮着生于花萼筒的中部稍下面, 与裂片互生, 上轮着生于花萼筒的喉部稍下面, 与裂片对生, 花药 1/2 伸出于喉部, 长圆形, 长 1.3 毫米, 两端钝圆形, 花丝极短 (长约 0.25 毫米); 花盘小, 环状; 子房卵形, 长 1.5 毫米, 无毛, 无子房柄, 花柱短, 柱头扁圆形, 具乳突。果实未见。花期 8—10 月。

仅发现西藏错那有分布。生于海拔 2900 米的山坡灌丛中。模式标本采自错那。

本种与长瓣瑞香 *D. longilobata* (Lecomte) Turrill 相近, 但花紫色, 花萼筒长仅 4 毫米, 裂片长达 5 毫米, 顶端钝圆形而不同。

19. 阿尔泰瑞香 (新疆植物名录)

Daphne altaica Pall. Fl. Ross. 1: 53, t. 35. 1784; Keiss. in Bot. Jahrb. 25: 37. 1898; Lecomte in Not. Syst. 3: 216. 1916.

落叶直立灌木, 高 40—60 米, 聚伞状分枝; 小枝伸长, 近圆柱形, 当年生枝紫褐色, 散生极少数白色柔毛, 一年生枝紫红色, 无毛或顶端有时微具柔毛, 多年生枝灰色, 无毛, 叶迹明显, 微突起; 顶芽锥形, 被细柔毛, 侧芽卵形, 较小。叶互生, 膜质, 长圆状椭圆形或椭圆状披针形, 长 3—5.5 厘米, 宽 0.8—1.2 厘米, 先端钝圆形或