

米；几无花序梗，花梗长 1—2 毫米，被长柔毛；花白色，稍带黄色，较大，芳香，4 数；花萼筒圆筒状，长 12—17 毫米，外面被小柔毛，内面无毛，裂片卵形或宽卵形，长 12—13 毫米，宽 7—10 毫米，顶端钝形，有时凹下；雄蕊 8，2 轮，均着生于花萼筒中部以上，上轮花药不伸出，花丝短，长 0.5 毫米，花药长的长圆形，长约 2 毫米，花盘杯状，边缘全缘，长 0.6—1 毫米；子房椭圆形，无毛，长约 4.5 毫米，具短柄，花柱短，柱头头状。果实未见。花期 6 月，果期不详。

特产于西藏东南部的米林。生于海拔 4260 米左右的山地北坡开旷的谷地。

40. 喙果瑞香 (植物研究)

Daphne rhynchocarpa C. Y. Chang in Bull. Bot. Res. 5 (3): 87. 1985.

常绿灌木；小枝互生或不规则分枝，灰褐色或栗褐色，稍粗壮，幼时微具条纹，疏生淡黄灰色短绒毛。叶互生，厚纸质或薄革质，椭圆形或倒披针形，长 5—11 厘米，宽 2—3 厘米，先端钝形，基部下延至叶柄，楔形，边缘全缘，微波状，稍反卷，上面深绿色，下面干燥后褐色，两面无毛，中脉在上面稍凹下或微扁平，下面隆起或稍隆起，侧脉 12—14 对，不规则开展和分叉，近边缘互相网结，上面略明显或稍凹下，下面显著，网状小脉在下面略明显；叶柄短，长 1—3 毫米，两侧翅状。1—3 花簇生于叶腋和小枝顶端；苞片小，卵状长圆形，长 4 毫米，宽 1.8 毫米，顶端钝形，具 1 束黄褐色柔毛，两面无毛，边缘具淡褐色缘毛；花序梗和花梗短，长 1—2 毫米，密被褐色丝状毛；花萼筒管状，长 8—10 毫米，外面被灰白色丝状毛，裂片 4，开展，卵形或卵状长圆形，长 4 毫米；雄蕊 8，2 轮，下轮着生于花萼筒的中部，上轮着生于花萼筒的喉部，花药 1/2 伸出于喉部，花丝短，花药黄色，长圆形，长约 1.7 毫米；花盘环状；子房无毛，花柱极短，柱头头状。果实卵形，幼时绿色，成熟时红色，长 7 毫米，直径 5 毫米，顶端渐尖，稍喙状，柱头宿存，偏向一侧。花期 11—12 月，果期次年 3—4 月。

产云南西南部 (镇康)。生于海拔 2500 米的林中。模式标本采自云南镇康。

本种与腋花瑞香 *D. axillaris* (Merr. et Chun) Chun et C. F. Wei 比较相近，但不同之点是叶片较大，长 5—11 厘米，宽 2—3 厘米，顶端钝形，侧脉显著，叶柄长 1—3 毫米；花萼裂片 4，雄蕊 8，子房无毛，易于区别。

41. 西畴瑞香 (植物研究) 图版 70: 1—3

Daphne xichouensis H. F. Zhou ex C. Y. Chang in Bull. Bot. Res. 5 (3): 99. 1985.

常绿直立灌木，高约 1 米；当年生枝灰褐色或紫褐色，圆柱形，稍具条纹，散生黄绿色细绒毛，多年生枝棕红色，无毛。叶互生，薄革质或纸质，长圆形至披针形，长 4.5—11 厘米，宽 1.5—2.8 厘米，先端钝尖，稀渐尖，基部宽楔形，边缘全缘，微反卷，上面鲜绿色，干燥后褐绿色，下面淡绿色，两面无毛，中脉纤细，上面凹下，下面稍隆起，侧脉 7—8 对，在上面微凹下，下面稍隆起；叶柄短，长 2—4 毫米，两侧近翅