

状，上面具沟，无毛。花粉白色，无香气，4—8朵组成顶生或侧生叶腋的头状花序，花下具苞片；苞片早落，卵状披针形或披针形，长5—7毫米，顶端渐尖，尖头具柔毛，边缘常内卷，具缘毛；花梗长1—1.4毫米，密被淡黄绿色丝状绒毛；花萼筒管状，长约7毫米，疏生灰白色短绒毛，上部稍扩大，直径约2.2毫米，裂片4，宽卵形，长3—4毫米，开展，顶端钝形或钝尖，无毛；雄蕊8，2轮，下轮着生于花萼筒的中部稍上面，上轮着生于花萼筒的喉部，花药伸出喉部，花丝短，花药长圆形，长1.6毫米；花盘浅盘状，边缘微波状；子房卵形或长卵形，无毛，花柱短，柱头膨大，表面具乳头状突起。果实近圆球形，幼时绿色，成熟时红色，直径约6毫米。花期1—2月，果期4月。

产云南东南部。生于海拔1500—1800米的湿润山坡灌木林内。模式标本采自云南西畴。

本种与白瑞香 *D. papyracea* Wall. ex Steud. 相近，但叶片的侧脉7—8对，上面微凹下，叶柄长2—4毫米；花的苞片长5—7毫米，除边缘具缘毛外，两面无毛，花萼筒管状，长约7毫米，疏生灰白色短绒毛，裂片宽卵形，长3—4毫米而不同。

42. 藏东瑞香（西藏植物志）

Daphne bholua Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 68. 1825; B. L. Burtt in Kew Bull. 1936; 437. 1936; 西藏植物志 3: 321, 图版 131: 1—2. 1986. —*D. cannabina* Wall. var. *bholua* (Buch.-Ham. ex D. Don) Keissl. in Bot. Jahrb. 25: 93. 1898.

42a. 藏东瑞香（原变种）

var. *bholua*

常绿灌木，高1.5—2.6米，多分枝；小枝暗棕红色，幼时顶部散生短硬毛，不久脱落，树皮褐色，叶迹显著，半圆形。叶互生，革质，窄椭圆形至长圆状披针形，长5—17厘米，宽1.7—3.2厘米，先端急尖，稀渐尖或钝形，基部宽楔形，边缘全缘，有时微反卷，上面亮绿色，下面淡绿色，两面无毛，中脉在上面凹下，下面隆起，直达顶端，侧脉纤细，11—16对，上面凹下，下面稍隆起；叶柄长1—5毫米，无毛，上面具沟槽。花紫红色或红色，芳香，7—12朵组成头状花序，顶生或生于小枝上部叶腋；苞片花期早落，宽披针形至长圆状卵形（外面的较短），长1.4—1.8厘米，宽0.4厘米，顶端尾尖，外面的苞片无毛，内面的苞片贴生丝状毛，边缘上部具缘毛，包围花序的基部；花梗短或无，稀长3—4毫米，上部具关节，密被黄绿色丝状毛；花萼筒筒状，长10毫米，基部稍扩大，外面密被丝状毛，内面光滑，裂片4，开展，卵形，长6毫米，宽4毫米，顶端微凹下，外面被毛；雄蕊8，2轮，均着生于花萼筒中部以上，下轮雄蕊与花萼裂片互生，上轮雄蕊与之对生，花丝长0.5毫米，花药长2毫米；花盘环状，长0.5毫米，全缘；子房无毛，具短柄，卵形，长4毫米，花柱短，长0.5毫米，