

1.5 毫米；雄蕊 8，2 列，上列着生于花萼管喉部，下列距喉部约 3 毫米，花药近无柄，披针形，细而长，约长 1.5 毫米；子房椭圆形，长约 3 毫米，中部以上丛生白色丝状毛，花柱线形，长约 3 毫米，柱头棒状，长约 2 毫米，被乳突状毛，花盘浅杯状，膜质，边缘不整齐。花期初春，果未见。

仅见于云南东南部（西畴）。

树皮纤维可作造纸原料。

本种与 *E. albiflora* Nakai 相近，但头状花序仅具花 15—17 花，花萼外面被银色发亮的绢毛而与之不同。

2. 滇结香（中国高等植物图鉴） 构皮树、长梗结香（中国经济植物志）

Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn. in Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 3: 208. t. 6. 1841, et in DC. Prodr. 14: 543. 1857; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 195. 1886, et in Curtis's Bot. Mag. 117, t. 7180. 1891, excl. syn. *E. chrysantha* Lindl. et *E. papyrifera* Zucc.; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 396. 1891, excl. syn. *E. chrysantha* Lindl. et *E. papyrifera* Zucc.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 589. 1933; H. Hara. Fl. E. Himal., Sec. Rep. 85. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 962, 图 3653. 1972; 西藏植物志 3: 328, 图版 135: 1—2. 1986. ——*Daphne gardneri* Wall. in As. Research. 13: 388, t. 9. 1820.

小乔木，高 3—4 米，茎褐红色，小枝无毛或于顶端疏被绢状毛；叶互生，窄椭圆形至椭圆状披针形，长 6—10 厘米，宽 2.5—3.4 厘米，先端尖，基部楔形，两面均被平贴柔毛，中脉在上面平，在下面特凸出，侧脉每边 8—9 条，在两面均明显；叶柄长约 4—8 毫米，被疏柔毛。头状花序球形，直径约 3.5—4 厘米，具 30—50 朵花，顶生或腋生，总苞早落，苞片叶状窄披针形；花序梗长约 2—2.5—5 厘米，向下弯垂，在开花时被白色绢毛，结果时毛全脱落；花无梗，花萼管长约 1.5 厘米，外面密被白色丝状毛，顶端 4 裂，裂片卵形，长约 3.5 毫米，宽约 2.5 毫米，先端尖或圆形，内面黄色，外面密被白色丝状毛；雄蕊 8，2 列，着生于花萼管喉部；子房椭圆形，长约 5 毫米，全部密被灰白色丝状长毛，花柱线形，长约 2 毫米，被毛，柱头棒状，长约 3 毫米，具乳突，花盘鳞片膜质，浅撕裂状。果卵形，外面全部为灰白色丝状长毛所包被；种子 1 粒，富含脂肪。花期冬末春初，果期夏季。

产西藏东部及云南西北部至西部。海拔 1000—2500 米的江边、林缘及疏林湿润处或常绿阔叶林中。尼泊尔、锡金、不丹、印度及缅甸北部也有分布。

树皮纤维为人造棉及造纸原料。

3. 结香（中国高等植物图鉴） 黄瑞香、打结花、雪里开、梦花（四川、广西、云南西畴），雪花皮（广东乐昌），山棉皮（湖北巴东），蒙花（广西植物名录、广东乐昌），三叉树（广西植物名录），三桠皮（湖南、云南），岩泽兰（贵州草药），金腰带