

药小，近椭圆形，基部稍分裂，顶端钝形，长约0.2毫米；子房椭圆形，具柄，花柱较长，纤细。果实较小，卵形或圆锥形，长约2毫米，无毛，为宿存的花萼筒包围，淡红色，顶端钝形。花，果期7—8月。

产新疆（塔城至巩留、新源）。生于海拔600—900米的沙质荒地。中亚地区、伊朗、阿富汗至印度西北部均有分布。

9. 狼毒属 *Stellera* Linn.

Linn. Sp. Pl. 559. 1753; Gilg in Engl. u. Prantl, Nat, Pflanzenfam. 3 (6a): 241. 1894; Hutch. Gen. Flow. Pl. 2: 255. 1967.

多年生草本或灌木，通常具木质的根茎。叶散生，稀对生，披针形，边缘全缘。花白色、黄色或淡红色，顶生无梗的头状或穗状花序，花萼筒筒状或漏斗状，在子房上面有关节，果实成熟时横断，下部膨胀包围子房，果实成熟时宿存，裂片4，稀5—6，开展，大小近相等；无花瓣；雄蕊8，稀10或12，2轮，包藏于花萼筒内，稀上轮花药一部分伸出；花盘生于一侧，针形或线状鳞片状，膜质，全缘或近2裂；子房几无柄，花柱短，柱头头状或卵形，具粗硬毛状突起。小坚果干燥，基部为宿存的花萼筒所包围，果皮膜质。

属名模式：狼毒 *Stellera chamaejasme* Linn.

本属约10—12种，分布于亚洲东部至西部的温带地区。我国有2种。

分种检索表

1. 草本；叶片顶端渐尖或急尖；多花的头状花序紧密，具绿色总苞，花萼裂片5，雄蕊10 1. 狼毒 *S. chamaejasme* Linn.
1. 灌木；叶片顶端通常凹下；3—5花簇生，无苞片，花萼裂片4，雄蕊8， 2. 台湾狼毒 *S. formosana* (Hayata) Li

1. 狼毒（通称） 断肠草（内蒙古），拔萝卜、燕子花（河北），馒头花（青海）

图版 72: 5—7

Stellera chamaejasme Linn. Sp. Pl. 559. 1753; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 401. 1894; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 551. 1916; 中国高等植物图鉴 2: 963, 图 3655. 1972; 贵州植物志 3: 186, 图版 77. 1986; 西藏植物志 3: 328, 图版 135: 1—4. 1986. ——*Chamaejasme stelleriana* Kuntze, Rev. Gen. 584. 1891. ——*Stellera bodinieri* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 369. 1912. ——*Wikstroemia chamaejasme* (Linn.) Domke in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 2: 363.