

毫米，直径约 1 毫米，无毛，花柱短，柱头头状，具乳状突起。果实未见。

产台湾南湖大山。生于海拔 3500—3700 米的高山顶上，为我国台湾特有种。

10. 假狼毒属 *Stelleropsis* Pobed.

Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. **12**:

148. 1950. et Fl. URSS. **15**: 510. 1949.

落叶亚灌木或多年生草本，茎直立，不分枝或少分枝，通常基部木质。叶互生，椭圆形、线形或披针形，全缘。头状花序或短穗状花序顶生，通常无叶状苞片；花梗极短，与花萼筒基部之间具关节；花萼筒通常漏斗状圆筒形，长 8—12 毫米，花后在子房上面微收缩，具关节，关节之下卵形或锥形至倒锥形，宿存，关节之上倒锥形至圆筒形，以后脱落，裂片 4；雄蕊 8，2 轮，生于花萼筒关节之上，上轮雄蕊与花萼裂片对生；花盘环状，倾斜，边缘不规则波状或圆齿状，子房顶端有长柔毛，花柱丝状。果实干燥，包被于花萼筒内。

属名模式：阿尔泰假狼毒 *Stelleropsis altaica* (Thunb.) Pobed.

本属有 10 种，主要产于中亚地区。我国有 2 种，产新疆。

分种检索表

1. 花序为稍伸长的穗状花序，花萼筒长 8—10 毫米；叶片长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，顶端钝形
..... 1. 阿尔泰假狼毒 *S. altaica* (Thunb.) Pobed.
1. 花序为头状花序，花萼筒长 10—12 毫米；叶片长 14—20 毫米，宽 3—5 毫米，顶端渐尖或急尖...
..... 2. 天山假狼毒 *S. tianschanica* Pobed.

1. 阿尔泰假狼毒 (新疆植物名录)

Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **12**: 148. 1950. — *Stellera altaica* Thieb. in Pers. Syn. **1**: 436. 1805. — *Passerina racemosa* Wikstr. in Acta Holm. 324. 1818. — *Wikstroemia altaica* (Thieb.) Domke in Biblioth. Bot. **3**: 59. 1934, p. p. — *Dianthron altaica* (Thieb.) Kit Tan in Not. Bot. Gard. Edinb. **40**: 219. 1982.

多年生直立草本，高 20—50 厘米；根茎木质，少分枝，褐色；茎单一，直立，不分枝，基部稍木质，具较多的叶痕迹。叶密，散生，草质，椭圆形，长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，先端钝形或急尖，基部楔形，稀钝圆形，边缘全缘，两面绿色，无毛，中脉明显，侧脉 3—5 对，近基部一对通常较长，两面有时明显；叶柄短，长 1—1.5 毫米。花带红色，芳香，穗状花序初较短，后伸长，长 3—7 厘米；花萼筒细圆筒状，长

8—10 毫米，无毛，裂片 4，宽披针形，长 5—6 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端渐尖；雄蕊 8，2 轮，均着生花萼筒的中部以上，两轮间相距 1—1.5 毫米，花丝短，花药长，长圆形，长 1.5 毫米，顶端和基部均凹陷；花盘偏斜，全缘，包围子房柄；子房椭圆形，具柄，顶端被毛，花柱长 1 毫米，柱头球状。坚果暗绿色，梨形，无毛，为花萼筒关节之下部包围。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产新疆（昭苏）。中亚地区及西伯利亚地区也有分布。

2. 天山假狼毒（新疆植物名录） 图版 72: 3—4

Stelleropsis tianschanica Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. 12. 153. 1950. — *Diarthron tianschanica* (Pobed.) Kit Tan in Not. Bot. Gard. Edinb. 40 (1): 220. 1982.

多年生草本，高 15—30 厘米；根茎木质，黄褐色或淡褐色；茎直立，10—20 条自基部发出，不分枝，草质或近基部稍木质，无毛，具小的叶脱落后的痕迹，绿色，一年生，稍粗大。叶散生，草质，长圆状椭圆形至长椭圆形，长 14—20 毫米，宽 3—5 毫米，顶端急尖或稍渐尖，基部宽楔形，边缘全缘，不反卷或有时微反卷，通常散生少数白色细柔纤毛，绿色，两面无毛，中脉明显，两面扁平或下面稍隆起，侧脉 3—5 对，基部第 2 对较长，两面稍明显；叶柄短，粗壮，基部具关节，扁平，长约 1 毫米。花淡粉红色，多花组成头状或短穗状花序，顶生，无苞片；花梗短，无毛，长 1—2 毫米，顶端具明显的关节，花萼筒漏斗状圆筒形，长 9—12 毫米，无毛，花后在子房上部收缩，具关节，关节之下宿存，关节之上脱落，裂片 4，长卵形或卵状披针形，长 5—7 毫米，宽 1.5—2.2 毫米，先端钝尖；雄蕊 8，2 轮，着生于花萼筒关节之上，上轮生于喉部以下，花丝短，花药长圆形，长约 1 毫米，两端凹下；花盘环状，偏斜，围绕子房基部，边缘宽凸起，牙齿状；子房椭圆形或近长圆形，长约 1.3 毫米，顶端或中部以上具褐色长柔毛，花柱短，纤细，柱头球形。坚果绿色，包藏于宿存的花萼筒基部，椭圆形。花期 6 月，果期 8 月。

我国仅新疆（昭苏）有分布。生于海拔 1700—2000 米的山坡草地。吉尔吉斯斯坦也有分布，模式标本采自天山山脉（吉尔吉斯斯坦）。

本种与阿尔泰假狼毒 *S. altaica* (Thieb.) Pobed. 很相近，但不同之处在于茎高 14—30 厘米，头状花序或极短的穗状花序。