

毫米，直径约 1 毫米，无毛，花柱短，柱头头状，具乳状突起。果实未见。

产台湾南湖大山。生于海拔 3500—3700 米的高山顶上，为我国台湾特有种。

10. 假狼毒属 *Stelleropsis* Pobed.

Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. **12**:

148. 1950. et Fl. URSS. **15**: 510. 1949.

落叶亚灌木或多年生草本，茎直立，不分枝或少分枝，通常基部木质。叶互生，椭圆形、线形或披针形，全缘。头状花序或短穗状花序顶生，通常无叶状苞片；花梗极短，与花萼筒基部之间具关节；花萼筒通常漏斗状圆筒形，长 8—12 毫米，花后在子房上面微收缩，具关节，关节之下卵形或锥形至倒锥形，宿存，关节之上倒锥形至圆筒形，以后脱落，裂片 4；雄蕊 8，2 轮，生于花萼筒关节之上，上轮雄蕊与花萼裂片对生；花盘环状，倾斜，边缘不规则波状或圆齿状，子房顶端有长柔毛，花柱丝状。果实干燥，包被于花萼筒内。

属名模式：阿尔泰假狼毒 *Stelleropsis altaica* (Thunb.) Pobed.

本属有 10 种，主要产于中亚地区。我国有 2 种，产新疆。

分种检索表

1. 花序为稍伸长的穗状花序，花萼筒长 8—10 毫米；叶片长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，顶端钝形
..... 1. 阿尔泰假狼毒 *S. altaica* (Thunb.) Pobed.
1. 花序为头状花序，花萼筒长 10—12 毫米；叶片长 14—20 毫米，宽 3—5 毫米，顶端渐尖或急尖...
..... 2. 天山假狼毒 *S. tianschanica* Pobed.

1. 阿尔泰假狼毒 (新疆植物名录)

Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **12**: 148. 1950. — *Stellera altaica* Thieb. in Pers. Syn. **1**: 436. 1805. — *Passerina racemosa* Wikstr. in Acta Holm. 324. 1818. — *Wikstroemia altaica* (Thieb.) Domke in Biblioth. Bot. **3**: 59. 1934, p. p. — *Dianthron altaica* (Thieb.) Kit Tan in Not. Bot. Gard. Edinb. **40**: 219. 1982.

多年生直立草本，高 20—50 厘米；根茎木质，少分枝，褐色；茎单一，直立，不分枝，基部稍木质，具较多的叶痕迹。叶密，散生，草质，椭圆形，长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，先端钝形或急尖，基部楔形，稀钝圆形，边缘全缘，两面绿色，无毛，中脉明显，侧脉 3—5 对，近基部一对通常较长，两面有时明显；叶柄短，长 1—1.5 毫米。花带红色，芳香，穗状花序初较短，后伸长，长 3—7 厘米；花萼筒细圆筒状，长