

11. 密花胡颓子 (中国高等植物图鉴)

Elaeagnus conferta Roxb., Fl. Ind. ed. Carey, 1: 460. 1820; Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2: 417. 1915; Lecomte Not. Syst. 3: 123. 1915; 中国高等植物图鉴 2: 968. 图 3665. 1972; Momiyama et Hara in Journ. Jap. Bot. 48 (9): 257. 1973. — *E. conferta* Roxb. subsp. *eu-conferta* Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 389. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 91. 1909.

11a. 密花胡颓子 (原变种)

Elaeagnus conferta Roxb. var. *conferta*

常绿攀援灌木, 无刺; 幼枝略扁, 银白色或灰黄色, 密被鳞片, 老枝灰黑色。叶纸质, 椭圆形或阔椭圆形, 长 6—16 厘米, 宽 3—6 厘米, 顶端钝尖或骤渐尖, 尖头三角形, 基部圆形或楔形, 全缘, 上面幼时被银白色鳞片, 成熟后脱落, 干燥后深绿色, 下面密被银白色和散生淡褐色鳞片, 侧脉 5—7 对, 弧形向上弯曲, 两面均明显, 细脉不甚明显; 叶柄淡黄色, 长 8—10 毫米。花银白色, 外面密被鳞片或鳞毛, 多花簇生叶腋短小枝上成伞形短总状花序, 花枝极短, 长 1—3 毫米, 花序比叶柄短; 每花基部具一小苞片, 苞片线形, 黄色, 比花梗长, 长 2—3 毫米; 花梗极短, 长约 1 毫米; 萼筒短小, 坛状钟形, 长 3—4 毫米, 在裂片下面急收缩, 子房上先膨大后明显骤收缩, 裂片卵形, 开展, 长 2.5—3 毫米, 顶端钝尖, 内面散生白色星状柔毛, 包围子房的萼管细小, 卵形, 长约 1 毫米; 雄蕊的花丝与花药等长或稍长, 花药细小, 矩圆形, 长约 1 毫米; 花柱直立, 疏生白色星状柔毛, 稍超过雄蕊, 达裂片中部, 向上渐细小, 柱头顶端弯曲。果实大, 长椭圆形或矩圆形, 长达 20—40 毫米, 直立, 成熟时红色; 果梗粗短。花期 10—11 月, 果期次年 2—3 月。

产云南南部和西南、广西西南; 生于海拔 50—1500 米的热带密林中。分布于中南半岛、印度尼西亚、印度、尼泊尔。

本种叶片大小不等, 阔椭圆形或椭圆形, 叶片和幼枝被银白色鳞片; 花序多花簇生, 比叶柄短, 萼筒坛状钟形, 几无花梗; 果实大, 长达 20—40 毫米以上, 易于认识。

11b. 勐海胡颓子 (变种) (植物研究室汇刊)

Elaeagnus conferta Roxb. var. *menghaiensis* W. K. Hu et H. F. Chow in Bull. Bot. Lab. Nor.-east. Forest. Inst. 6: 107. 1980.

与原变种的区别在于本变种幼枝被锈色鳞片; 叶片矩圆形, 下面干燥后灰褐色, 包围子房的萼管和花梗红锈色, 花柱无毛。

产云南(勐海); 生于海拔 1400—1900 米的密林中。

12. 大叶胡颓子 (中国种子植物名称) 圆叶胡颓子

Elaeagnus macrophylla Thunb., Fl. Jap. 67. 1784; Schlechtend. in DC., Prodr. 14: 614. 1857; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. ser. 3, 15: 373. 1780; Serv. in Bot. Centralbl. Beih. 25: 67. 1909; Nakai in Bot. Mag. Tokyo