

1.3 毫米。果实未见。 花期 9—12 月。

产云南；生于海拔 1700—3100 米的向阳山地疏林中或灌丛中。模式标本采自云南鹤庆(大坪子)。

本种与披针叶胡頹子 *E. lanceolata* Warb. 和长叶胡頹子 *E. bockii* Diels 相近，区别在于本种的叶片为椭圆形或矩圆状披针形，叶柄长 12—15 毫米；花梗长 5—8 毫米，花柱密被白色星状长柔毛。

27. 攀援胡頹子 图版 9: 5—6

Elaeagnus sarmentosa Rehd. in Sarg., Pl. Wils. 2: 417. 1915.

常绿攀援灌木，高 2—10 米，无刺；幼枝密被锈色鳞片，老枝灰黄绿色或鳞片脱落后黑色；芽绿色。叶纸质或近革质，椭圆形或矩圆形，长 8—16 厘米，宽 2.2—6 厘米，顶端渐尖或钝尖，基部阔钝形或圆形，上面干燥后黄绿色，下面褐绿色，密被银白色和褐色细鳞片，有光泽，侧脉 7—9 对，与中脉开展成 45—50 度的角，近边缘分叉而互相连接，两面明显凸起，干燥后网状脉在上面略明显；叶柄锈色，上面具宽沟，长 10—16 毫米。花褐色或褐绿色，外面被褐色鳞片，常 1—3 花簇生于叶腋纤细的锈色短小枝上；花梗长 3—6 毫米；萼筒圆筒形，长 8—9 毫米，向基部略窄狭，在子房上明显骤收缩，裂片宽三角形，长 4.5—5 毫米，顶端渐尖，内面疏生星状短柔毛，包围子房的萼管椭圆形，锈色，长 3 毫米；雄蕊 4，花丝较短，基部膨大，花药矩圆形，长 1.5—2 毫米；花柱直立，无毛，柱头弯曲，几与裂片平齐。果实大，长椭圆形，长 24—26 毫米，直径 10 毫米，被锈色鳞片；果核窄椭圆形，两端窄狭，具明显的 8 肋，内面具褐色丝状长棉毛。 花期 10—11 月，果期次年 3 月。

产云南、广西；生于海拔 1100—1500 米的地区。模式标本采自云南蒙自。

本种为大藤本；叶片纸质，网状脉在上面略明显；花较大，花柱无毛，几与裂片平齐；果实大，长 24—26 毫米，直径 10 毫米，易于认识。

28. 樟叶胡頹子 (植物研究室汇刊) 图版 10: 1—3

Elaeagnus cinnamomifolia W. K. Hu et H. F. Chow in Bull. Bot. Lab. Nor.-east. Forest. Inst. 6: 114 1980.

常绿攀援灌木，无刺；幼枝黄褐色，有棱角，被糝糠状鳞片，老枝圆柱形；髓大，淡褐色。叶羊皮纸质，长倒卵形至宽倒披针形，稀矩圆形，长 6—15 厘米，宽 3.5—6 厘米，顶端渐尖，基部楔形至宽楔形，边缘全缘，略反卷，上面绿色，幼时疏生淡黄褐色鳞片，成熟后脱落，下面银白色，密被白色和散生少数淡黄褐色鳞片，侧脉 5—6 对，与中脉开展成 35—45 度的角，近边缘分叉而互相连接，上面不明显凸起，下面显著，网状脉在上面显著，下面不清晰；叶柄淡黄褐色，长 8—16 毫米。花银白色，质厚，密被银白色和散生少数黄褐色鳞片，近直立或下垂，常 1—3 花簇生于叶腋短小枝上成总状花序，花枝淡黄褐色，长 4—5 毫米；花梗长 7 毫米；萼筒圆筒状漏斗形，略具 4 肋，长 8—9 毫米，喉部宽 3.5—4

毫米,向基部窄狭,基部宽 1.4 毫米,裂片长三角形,长 5.5—6 毫米,顶端渐尖,内面密被银白色鳞毛和星状柔毛;雄蕊的花丝极短,花药矩圆形,长 1.6 毫米;花柱细圆柱形,无毛,上部弯曲,长 9.5 毫米,顶端不超过雄蕊,柱头微反曲。果实未见。花期 11 月至次年 1 月。

产广西东部;生于海拔 400—600 米的山地沟边。模式标本采自广西荔浦、金秀的老山。

本种与宜昌胡頹子 *E. henryi* Warb. 相近,但本种的叶片长倒卵形至宽倒披针形,上面暗绿色,具稀疏鳞片;花大,白色,质厚,裂片长达 6 毫米,花柱不超过雄蕊而相区别。

29. 蔓胡頹子(种子植物名称) 抱君子、藤胡頹子

Elaeagnus glabra Thunb., Fl. Jap. 67. 1784; Schlechtend. in DC., Prodr. 14: 614. 1857; Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 386. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 73. 1909; Schneid., Ill. Handb. Laubh. 2: 412. f. 281i—1. 282b—c. 1909; Kanehira, Formos. Trees Rev. ed. 484. f. 445. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 874. 图 768. 1937; 侯宽昭等, 广州植物志 420. 1958 Li, Woody Fl. Taiwan 622. 1963; 中国高等植物图鉴 2: 1968. 图 3666. 1972.—*E. tenuiflora* Benth. in Kew. Journ. Bot. 5: 197. 1853; Schlechtend. in DC., Prodr. 14: 613. 1857.—*E. glabra* Thunb. subsp. *oxyphylla* Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 386. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 76. 1909.—*E. buisanensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 87. f. 31—1. 1920.—*E. daibuensis* Hayata, op. cit. 9: 88. f. 31—5, 1920.—*E. paucilepidota* Hayata, op. cit. 9: 92. f. 32—6. 1920.—*E. latifolia* auct. non Linn.: Lour., Fl. Cochinch. 89. 1790.

常绿蔓生或攀援灌木,高达 5 米,无刺,稀具刺;幼枝密被锈色鳞片,老枝鳞片脱落,灰棕色。叶革质或薄革质,卵形或卵状椭圆形,稀长椭圆形,长 4—12 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端渐尖或长渐尖、基部圆形,稀阔楔形,边缘全缘,微反卷,上面幼时具褐色鳞片,成熟后脱落,深绿色,具光泽,干燥后褐绿色,下面灰绿色或铜绿色,被褐色鳞片,侧脉 6—8 对,与中脉开展成 50—60 度的角,上面明显或微凹下,下面凸起;叶柄棕褐色,长 5—8 毫米。花淡白色,下垂,密被银白色和散生少数褐色鳞片,常 3—7 花密生于叶腋短小枝上成伞形总状花序;花梗锈色,长 2—4 毫米;萼筒漏斗形,质较厚,长 4.5—5.5 毫米,在裂片下面扩展,向基部渐窄狭,在子房上不明显收缩,裂片宽卵形,长 2.5—3 毫米,顶端急尖,内面具白色星状柔毛,包围子房的萼管椭圆形,长 2 毫米;雄蕊的花丝长不超过 1 毫米,花药长椭圆形,长 1.8 毫米;花柱细长,无毛,顶端弯曲。果实矩圆形,稍有汁,长 14—19 毫米,被锈色鳞片,成熟时红色;果梗长 3—6 毫米。花期 9—11 月,果期次年 4—5 月。