

rea-variegata, var. frederici (*E. aurea-picta*), var. reflexa (*E. reflexa* Decais), var. simonii (*E. simonii* Carr.), var. variegata, 本文暂未收录。

**卵叶胡颓子** *Elaeagnus ovata* Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 8: 376. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 64. 1909.

“灌木, 无刺, 幼枝锈色, 成熟后锈灰色, 光亮。叶脱落, 近革质, 卵形或近圆形, 甚小, 长 2—2.5 厘米, 宽 1.3—1.5 厘米, 边缘波状, 上面绿色, 有时散生银色鳞片, 下面银白色, 散生红色鳞片; 叶柄有沟槽, 银白色。花单生, 直立, 白色, 发亮, 常 1—3 花生于极短枝上, 萼筒近四角形, 极短, 长 2.5 毫米, 裂片三角形, 内面几无毛, 稀微被星状柔毛, 长 2.5 毫米; 花柱略具毛, 先端内弯, 不贴生于花药; 花药无毛, 几无花丝, 与裂片平齐; 花盘不明显。果实未见。”

产上海。

我们未见模式标本和照片, 根据原始记载和我们所看过的上海地区的标本, 它与胡颓子 *E. pungens* Thunb. 很相近似, 只是各部显得小一些, 关于落叶问题, 我们也看到了江苏的一号标本, 幼果时几无去年老叶, 但发现仅存的一片叶, 它是革质的。因此卵叶胡颓子 *E. ovata* Serv. 很可能是胡颓子的异名, 还有待进一步考证。

31. 香港胡颓子 图版 10: 4—6

*Elaeagnus tutcheri* Dunn in Journ. Bot. Brit. et For. 45: 404. 1907.

常绿直立灌木, 无刺; 幼枝锈色, 被鳞片, 老枝鳞片脱落, 灰褐色或灰黑色。叶近革质或纸质, 阔椭圆形或近圆形, 长 4—8 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 顶端钝形或圆形, 基部圆形至窄圆形, 边缘反卷成波状, 上面幼时具黄褐色鳞片, 成熟后脱落, 具光泽, 干燥后暗褐色或黑褐色, 下面黄白色, 密被银白色和褐色鳞片, 侧脉 5—7 对, 与中脉开展成 50—60 度的角, 近边缘分叉而互相连接, 上面甚凸起, 下面略明显, 网状脉在上面略明显或不清晰; 叶柄锈色, 长 6—8 毫米。花银白色, 密被银白色和散生少数褐色鳞片, 数花簇生叶腋短小枝上成短总状花序, 花枝长 2—3 毫米; 花梗锈色, 长 2—3 毫米; 萼筒钟形, 长 4—5 毫米, 裂片下宽 3 毫米, 向基部稍窄狭, 在子房上骤收缩, 裂片卵形, 直立, 长 2—2.5 毫米, 顶端急渐尖, 内面疏生白色星状柔毛; 雄蕊的花丝极短, 花药矩圆形, 长 1.5 毫米; 花柱直立, 稍弯曲, 无毛。果实长椭圆形或矩圆状卵形, 两端圆形, 长 10—12 毫米, 被锈色鳞片; 果核椭圆形, 内面具丝状棉毛; 果梗长 3—5 毫米。花期 11—12 月, 果期次年 3 月。

产广东、湖南南部; 生于海拔 500 米以下的向阳地区。模式标本采自广东沿海岛屿。

本种显著的特征为叶片广椭圆形或近圆形; 萼筒短, 钟形, 长 4—5 毫米, 裂片长为萼筒的 1/2 倍, 花柱无毛。

32. 宜昌胡颓子 (中国高等植物图鉴) 图版 11: 1—3

*Elaeagnus henryi* Warb. apud Diels in Engl., Bot. Jahrb. 29: 483.



1—3. 樟叶胡颓子 *Elaeagnus cinnamomifolia* W. K. Hu et H. F. Chow: 1. 花枝; 2. 花纵切面; 3. 花柱; 4—6. 香港胡颓子 *Elaeagnus tutcheri* Dunn: 4. 花枝; 5. 花; 6. 花纵切面。

(冯先洁绘)