

本属约 12 种,产于美洲热带地区。我国引入栽培的有 1 种。

1. 丽薇 图版 22: 3

Lafoensia vandelliana Cham. et Schlechtend. in *Linnaea* 2: 346. 1827; DC., *Prodr.* 3: 94. 1828; Koehne in *Engl., Bot. Jahrb.* 3: 151. 1882 et in *Engl., Pflanzenr.* 17 (IV-216): 213. f. 40. 1903.

乔木状灌木,高 2—8 米;枝圆柱形。叶交互对生,薄革质,倒卵形或倒卵状矩圆形,长 5—9 厘米,宽 3—4.5 厘米,顶端近圆形或钝形,顶部微凹,常反折,上面亮绿色,有光泽,下面中脉近顶部有一腺体或小孔,侧脉每边有 15—18 条,与中脉几乎成 90 度的角开展,在两面均明显凸起,叶柄长 2—8 毫米。花单生或数朵成带叶的圆锥花序状,花梗长 1.2—2.5 厘米,稍压扁;花 8—13 基数,通常 10 基数;花萼半球形,长 13—16 毫米,10 裂,裂片披针状三角形,长约 7 毫米,常反折;花瓣白色,矩圆形或倒卵状矩圆形,长 2.5—3 厘米,顶端微缺或啮蚀状;雄蕊约 22,花丝长 6—7 厘米;子房扁球形,具长 1—2 毫米的柄,花柱长 6.5—7 厘米。蒴果长 3.5 厘米,直径 2.5 厘米;种子连翅长 2.5—3 厘米,宽 1.2 厘米。

本种产于巴西及巴拉圭。我国曾有少量引种。花美丽,为观赏植物。

8. 水茛花属——*Pemphis* Forst.

Forst., *Char. Gen. Pl.* 67. 1776.

灌木或小乔木。叶对生,全缘,极厚,肉质。花单生叶腋,花梗基部有 2 枚小苞片;花 6 基数,辐射对称;萼筒钟状或浅杯状,有 12 至多数棱,6 裂,裂片短而直立,三角形,裂片间有 6 枚短小的附属体,角状;花瓣 6,着生于萼筒顶部;雄蕊 12,2 轮,着生于萼筒近中部;子房小,基部 3 室,每室胚珠多数,花柱长,柱头头状。蒴果革质,球形或倒卵形,包藏于萼管内或上半部伸出萼外,成不规则的周裂;种子多数,楔状倒卵形,有棱或稍压扁,种皮常扩大成翅。

本属有 2 种,1 种产东半球热带海岸,另 1 种产马达加斯加。我国有 1 种。

1. 水茛花 (中国树木分类学)

Pemphis acidula J. R. et Forst., *Char. Gen. Pl.* 68. Pl. 34. 1776; Koehne in *Engl., Bot. Jahrb.* 3: 133. 1882 et in *Engl., Pflanzenr.* 17 (IV-216): 185. f. 30b. 1903; Kanehira, *Formos. Trees Rev. ed.* 489. f. 451. 1936; 陈嵘, *中国树木分类学*, 894. 1959; Li, *Woody Fl. Taiwan* 628. 1963; Backer et Bakh., *Fl. Java* 1: 255. 1963.

多分枝小灌木,高约 1 米,有时成小乔木状,高达 11 米;小枝、幼叶和花序均被灰色短柔毛。叶对生,厚,肉质,椭圆形、倒卵状矩圆形或线状披针形,长 1—3 厘米,宽 5—15 毫米;无叶柄或叶柄仅长 2 毫米。花腋生,花梗长 5—13 毫米,苞片长约 4 毫米;花二型,花



1—2. 虾子花 *Woodfordia fruticosa* Kurz: 1.花枝; 2.花。
3. 丽蕊 *Lajoensia vandelliana* Cham. et Schlechtend. 花枝。(何顺清绘)