

1.5—2 厘米；雄蕊 24—45，1 轮排列，花丝长 3.5—4.5 厘米，花药长约 1 厘米，内弯；子房半下位，4—7 室，花柱长 4—5 厘米，黄绿色，柱头头状，暗绿色。蒴果长 1.5—2.5 厘米，直径 1.7—2.5 厘米。花期 5 月。

广东海南岛引种。分布印度尼西亚爪哇(原产地)，斯里兰卡引种栽培已有二百多年历史。模式标本采自斯里兰卡国家植物园。

本种木材直，纹理密细，多作建筑或家具用材。

4. 隐翼科——CRYPTERONIACEAE

乔木，高可达 30 米。叶对生，宽椭圆形至披针形；羽状脉，全缘。雌雄异株或杂性，总状花序很长，由数总状花序集为圆锥花序；花细小而柔弱；无花瓣，花药侧生，中央胎座，胚珠多数。蒴果瓣裂；种子多数。

本科仅 1 属、5 种。产印度东北至越南、菲律宾等东南亚热带地区。我国只有 1 种，产云南南部。

1. 隐翼属——*Crypteronia* Bl.

Bl. Bijdr. 1151. 1826; Mus. Lugd. Bat. 2: 123. 1852.

乔木。叶纸质至革质。花白色或乳白绿色；苞片线形或锥形；萼齿 4—5，宿存；雄花的雄蕊花丝着生于萼筒喉部，与萼齿互生，长于雌花；子房球形，密被柔毛，花柱长或短，柱头头状，近二裂。蒴果密被柔毛，成熟后自顶端裂为二瓣，柱头、花柱及中隔亦随之一分为二；种子多数，椭圆形，其先端一侧及基部有膜状翅。无胚乳；子叶柱状；胚根钝，达脐的基部。

原产东南亚热带地区。我国 1 种，产云南。

1. 隐翼木(新拟) 隐翼(植物分类学报、中国高等植物图鉴) 图版 33

Crypteronia paniculata Bl., Bijdr. 1151. 1826; Mus. Lugd. Bat. 2: 123. t. 42. 1852; Koorders et Valetton, Atlas Baumart. Java 3. f. 318. 1914; Gagn. et Guill. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-chine. 2: 696. 1920; Ridley, Fl. Malay Pnins. 1: 821. f. 66. 1922.——*Henslowia pubescens* Wall., Pl. As. Rar. 3: 14. 1832.——*H. glabra* Wall. op. cit. 1832.——*Crypteronia pubescens* (Wall.) Bl. Mus. Lugd. Bat. 2: 123. 1852; Clarke in Hook. f., Fl. Brit. India 2: 574. 1879.——*C. glabra* (Wall.) Bl. op. cit. 123. 1852; Clarke, op. cit. 574. 1879; Acta Phytotax. Sinica 6 (2): 246. 1957; 中国高等植物图鉴 2: 978. 图 3686. 1972.

乔木，高 12—30 米，胸径 50 厘米左右；枝条扁圆，有皮孔及纵纹，无毛。叶对生，宽