

年生的树仅高 3.5 米。树皮含单宁 17%—26%。材质坚重,耐腐,可作车轴、把柄等小件用材。

4. 木榄属——*Bruguiera* Lamk.

“Poir. in Lam., Tabl. Enc. (Text.) 2: 517. 1794 nom. inval;”
Lam., Tabl. Enc. 1: 397. 1797; Benth. et Hook., Gen. Pl. 1:
679. 1865.

乔木或灌木,有板状支柱根或曲膝状气根。叶革质,交互对生,全缘,无毛,具柄;托叶膜质,常早落。花无小苞片,常在花梗基部具关节,腋生,单生或 2—5 花组成具总花梗的聚伞花序;花梗下弯;花萼革质,7—14(—16) 深裂,裂片钻状披针形,萼筒钟形或倒圆锥形;花瓣与花萼裂片同数;雄蕊为花瓣的 2 倍,每 2 枚雄蕊为花瓣所抱持,花药 4 室,纵裂;花盘着生于萼筒上;子房下位,2—4 室但常为 3 室,每室有胚珠 2 颗,花柱丝状,柱头 2—4 裂。果实藏于萼管内或与它合生,1 室 1 种子;种子无胚乳,于果实未离母树前萌发;胚轴圆柱形或纺锤形。

本属模式种: 木榄 *Bruguiera gymnorhiza* (Linn.) Savigny

本属约有 7 种,分布东半球热带海滩,从非洲东部至亚洲,经马来西亚到澳大利亚北部和波利尼西亚。我国有 3 种和 1 变种。

本属的木材很少作建筑用,多作薪炭用材。树皮可提取单宁,但不及红树属普遍。

木榄属分种检索表

1. 花单生,花萼裂片 9—13 枚,结实时略扩展,不向外反卷,长 1.7—2.5 厘米。
 2. 萼平滑,花瓣中部以下密被长粗毛,上部无毛或近无毛.....1. 木榄 *B. gymnorhiza* (Linn.) Savigny
 2. 萼具纵棱;花瓣边缘具长粗毛。
 3. 花萼裂片 9—11 枚,通常 10,花瓣 2 裂,每 1 裂片顶端钝形,向外反卷.....2. 海莲 *B. sexangula* (Lour.) Poir.
 3. 花萼裂片 11—13 枚,通常 11,花瓣 2 裂,裂片顶端尖,具 1—2 条刺毛.....2a. 尖瓣海莲 *B. sexangula* (Lour.) Poir. var. *rhynchopetala* Ko
1. 花 2 至多朵组成具总梗的聚伞花序,很少单生,花萼裂片 7—8,结实时向外反卷,长 0.8—1.2 厘米.....3. 柱果木榄 *B. cylindrica* (Linn.) Bl.

1. 木榄(广西钦县) 包罗剪定(广东徐闻),鸡爪浪(广东台山),剪定、枷定(广东海南),大头榄、鸡爪榄(广西合浦),五脚里、五梨蛟(台湾)