

1940; How et Ho in *Acta Phytotax. Sinica* 2(2): 144. 1953, excl. specim. R. C. Ching 8079.

灌木或小乔木;小枝和枝干燥时紫褐色,有明显的纺锤形的木栓质皮孔。叶纸质,矩圆形,稀倒披针形,长5—13厘米,宽2.5—5.5厘米,顶端渐尖或尾状,基部阔楔形,边缘有篦状小齿;叶柄长5—6毫米。花序具短总花梗,二歧分枝,长1.5—2厘米,或稍长;花具短梗,2—3朵生于分枝的顶部;小苞片微小,膜质;花萼近圆形,直径4—6毫米,6—7深裂,裂片长三角形;花瓣白色,盛开时长、宽各1.8—2毫米,顶端2裂,边缘皱褶和不规则分裂,花瓣柄长0.8—1毫米。果实球形,直径6—7毫米,成熟时红色,有宿存的红色花萼裂片;种子矩圆形或近肾形。 花果期春夏两季。

产广东、广西、云南;生于山谷或溪畔杂木林内。模式标本采自广东。

6. 山红树属——*Pellacalyx* Korth.

Korth., *Tijdschr. Nat. Geschied. Physiol.* 3: 20. 1836.——*Plaesiantha* Hook. f., *Gen. Pl.* 1: 681. 1865.

乔木;小枝中空。叶交互对生,全缘或具不明显的小齿;托叶外面具星状毛。花簇生或排列成分枝的团伞花序,稀单生,有微小的小苞片;花萼筒状,4—5裂,稀3或6裂;花瓣与花萼裂片同数,着生于萼筒边缘,外面密被毛,顶端具齿或为各种深度的撕裂;雄蕊为花瓣的2倍,生于萼筒喉部,内弯,锥形或三角形,分离或基部连合,不等长,通常长短各半,花药近圆形,4室,纵裂;子房下位,5—10室,稀6或12室,每室具多数(8—25)胚珠,花柱柱状,常被毛,柱头盘状或头状,有不明显的分裂。果实近球形,种子多数;具胚乳,离母树后始发芽;胚线形。

本属模式种:腋花山红树 *Pellacalyx axillaris* Korth.

本属约有8种,分布于泰国、缅甸、马来西亚、菲律宾。我国有1种。

1. 山红树 图版 40

Pellacalyx yunnanensis Hu in *Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot.* 10:130. 1940; How et Ho in *Acta Phytotax. Sinica*, 2: 146. 1953.

乔木,高达15米,小枝粗壮,具条纹,被疏长毛。叶膜质,倒披针形至披针形,长13—20厘米,宽4.5—6.5厘米,顶端短渐尖,基部楔形,边缘有小齿,干燥后微反卷,上面无毛,下面沿中脉和侧脉有散生的短毛,侧脉8—9对,叶柄长1—2厘米。花未见。果实单生,近球形,直径1.5厘米,顶端有6—7枚宿存的花萼裂片;裂片披针形,长1—1.2厘米,短尖;有宿存花柱和柱头,花柱粗壮,短于花萼裂片,柱头头状,6深裂,每一裂片再浅裂;果梗纤细,长约2厘米;种子多数,矩圆形,黑褐色,有窝孔。 果期冬季。

产云南南部;生于海拔850米的林中。模式标本采自云南。