

2.5—5.5 厘米,全缘,近叶基边缘有腺体,无毛或沿中脉上面被小柔毛,或幼时背面薄被柔毛,侧脉 8—10 对,稀有 6 对者,稍斜举,两面均微凸起,网脉稠密而显著;叶柄长 1—2.4 厘米。花序顶生或腋生,由多数穗状花序组成圆锥花序式,长 6—8 厘米,密被深黄而带红色的柔毛;苞片卵形,长约 4.5 毫米,两端均渐尖,先端外弯,密被深黄色的柔毛,早落;花细小,4—5 数,白色,有香气;小苞片披针形,长 1.5 毫米,被白色柔毛;萼筒杯状,长 1.5 毫米,裂齿三角形,外面无毛,内面密被纤维状白色长毛;花盘小,无毛;雄蕊 8—10 枚,插生于萼筒上,伸出花萼约 2 倍,花丝纤细,长 4.5 毫米,花药黄色,药隔突出;子房卵形,长约 1 毫米,无毛,胚珠 2 枚;花柱长 4—5 毫米。果椭圆形或倒卵形,有 3 翅,连翅长 (1.5—)2.5—3.5 厘米,宽 1.5—2 厘米,翅半革质,有横条纹,无毛,基部钝圆,先端钝三角形,高出果核约 5 毫米,边缘浅波状,绿而微红,成熟时变黑而带紫或青紫色。花期 7—9 月,果期 10 月开始。

产广东海南岛。在中海拔森林中常见,为当地著名的优良用材树种之一。

2. 千果榄仁

Terminalia myriocarpa Van Huerck et Muell.-Arg. Obs. Bot. 215. 1870; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 448. 1878; Exell in Sunyatsenia 1: 91. 1933 et in Fl. Males. 1(4): 554. 1954; 赵爱真, 植物分类学报 7(3): 234. 1958; O. Lecompte in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 10: 80. Pl. X, 1—7. 1969; 云南植物志 1: 80. 图版 21, 4—5. 1977——*Pentaptera saja* Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3983. 1831, nom. nud.——*T. saja* Steud. Nom. ed. 2, 2: 669. 1841——*Myrobalanus myriocarpa* Kuntze Rev. Gen. Pl. 237. 1891.

2a. 千果榄仁(原变种) 大马缨子花,千红花树(云南) 图版 2: 4—5

var. *myriocarpa*

常绿乔木,高达 25—35 米,具大板根;小枝圆柱状,被褐色短绒毛或变无毛。叶对生,厚纸质;叶片长椭圆形,长 10—18 厘米,宽 5—8 厘米,全缘或微波状,偶有粗齿,顶端有一短而偏斜的尖头,基部钝圆,除中脉两侧被黄褐色毛外,其余无毛或近无毛,侧脉 15—25 对,两面明显,平行;叶柄较粗,长 5—15 毫米,顶端有一对具柄的腺体。大型圆锥花序,顶生或腋生,长 18—26 厘米,总轴密被黄色绒毛。花极小,极多数,两性,红色,长(连小花梗) 4 毫米;小苞片三角形,宿存;萼筒杯状,长 2 毫米,5 齿裂;雄蕊 10, 突出;具花盘。瘦果细小,极多数,有 3 翅,其中 2 翅等大,1 翅特小,长约 3 毫米,宽(连翅) 12 毫米,翅膜质,干时苍黄色,被疏毛,大翅对生,长方形,小翅位于两大翅之间。花期 8—9 月,果期 10 月至翌年 1 月。

产于广西(龙津)、云南(中部至南部)和西藏(墨脱),为产区的习见上层树种之一。越南北部、泰国、老挝、缅甸北部、马来西亚、印度东北部、锡金也有分布。

木材白色、坚硬,可作车船和建筑用材。