

产云南西部。分布于缅甸(庇古、毛淡棉至典那沙冷)。

4. 榄李属——*Lumnitzera* Willd.

Willd. in Ges. Naturf. Freund. Neus Schr. 4: 186. 1803; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 687. 1865; Brandis in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam. 3(7): 127. 1893; 海南植物志 2: 43. 1965; Exell et Stace in Bol. Soc. Brot. 40. 1966.

灌木或小乔木,平滑无毛。叶肉质,全缘,有光泽,密集于小枝末端,具极短的柄。总状花序,腋生或顶生;萼管延伸于子房之上,近基部具小苞片2枚,裂齿5;花瓣5片,红色或白色;雄蕊10个或少于此数;子房下位,1室,胚珠2—5颗,倒悬于子房室的顶端。果实木质,长椭圆形,近于平滑或具纵沟纹;种子1颗。

2种,产东非至马达加斯加、大洋洲北部、亚洲热带及太平洋地区。我国2种均有,产台湾及广东海南岛。

本属植物多生于潮水能到达的热带海岸的盐滩上,为热带海岸红树林的成分之一。

分 种 检 索 表

- 1. 花序顶生;花瓣深红色;雄蕊超出冠外,长约为花瓣之2倍;果纺锤形,果柄长约5毫米 1. 红榄李 *L. littorea* (Jack) Voigt
- 1. 花序腋生;花瓣白色,雄蕊不超出冠外,与花瓣等长;果卵形,果柄长约1毫米 2. 榄李 *L. racemosa* Willd.

1. 红榄李

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt in Hort. Suburb. Calc. 39: 1845; Kurz For. Fl. Brit. Burma 1: 469. 1877; 赵爱真, 植物分类学报 7: 237. 1958; 海南植物志 2: 44. 1965; O. Lecompte in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 10: 18. 1969 — *Pyrrhanthus littoreus* Jack in Mal. Misc. 2: 57. 1822.

乔木或为小乔木,高达25米,径达50厘米,有细长的膝状出水面呼吸根;树皮黑褐色,纵裂;幼枝淡红色或绿色,无毛,枝广展,具纵裂,有叶痕。叶互生,常聚生枝顶,叶片肉质而厚,倒卵形或倒披针形,或窄倒卵状椭圆形,长(2—)6.5—8厘米,宽1.5—2.8厘米,先端钝圆或微凹,基部渐狭成一不明显的柄,叶脉不明显,侧脉4—5对,上举;无柄或近无柄。总状花序顶生,长3—4.5厘米,花多数;小苞片2枚,三角形,长1.5—2毫米,具腺毛;萼片5枚,扁圆形,长约1.5毫米,先端钝圆,复瓦状排列,边缘具腺毛;花瓣5枚,红色,长圆状椭圆形,长5—6毫米,先端渐尖或钝头;雄蕊5—10枚,通常7枚,长约10毫