

2. 十蕊风车子

Combretum roxburghii Spreng. in Syst. Veg. 2: 331. 1825. — *C. decandrum* Roxb. Pl. Corom. 1: 43. 1796. et Fl. Ind. 2: 232. 1832; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 452. 1878; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 744. 1920; 赵爱真, 植物分类学报 7: 243. 1958; O. Lecompte in Aubrev. Camb. Laos Vietn. 10: 24. 1969. nec Ruiz et Pavon ex G. Don 1832; 云南植物志 1: 89. 1977.

直立灌木, 具下垂或近攀援的枝条; 小枝纤弱, 幼时有带红色微毛。叶对生, 叶片革质, 长圆状椭圆形至倒卵状长圆形, 长 6.5—12 (—15) 厘米, 宽 3—4.5 (—7) 厘米, 先端尾尖, 钝, 基部钝或钝圆, 两面无毛, 仅背脉上有疏毛, 脉腋内有簇毛, 侧脉 6—7 对, 表面略可见, 背面极突出, 第三回脉斜出, 密而平行; 叶柄短, 长 5—7 毫米, 上面具槽, 近上部有丛生的毛。圆锥花序腋生或顶生, 分枝, 苞叶卵形, 长约 1.5 厘米, 宽约 1 厘米, 密被绒毛, 苞片披针形, 宿存; 花细小, 密集, 长 5—6 毫米; 萼杯状, 外面被金黄色长绒毛, 内面基部有较短柔毛, 裂片 5, 细小, 尾状三角形, 长约 1 毫米; 花瓣 5, 倒卵状长圆形, 长约 2 毫米, 两面被黄色长柔毛; 雄蕊 10 枚, 着生于由 5 个腺体组成、密被白色柔毛的花盘边缘, 长不出冠外; 子房圆柱状, 长约 2 毫米; 花柱短, 锥状, 长 2 毫米, 无毛; 胚珠 2 或 3 颗。果长圆形, 无柄, 先端渐尖, 长 2—3 厘米, 径 0.8—1 厘米, 无毛, 具 5 翅, 翅膜质, 光亮而有条纹。

产云南西南部、广西南部。广西(那坡)新纪录。分布于老挝、尼泊尔、缅甸、泰国。栽培于印度。

枝条长而柔弱, 可供织篮用。

3. 石风车子(云南植物志)

Combretum wallichii DC. Prodr. 3: 21. 1823; Exell in Sunyatsenia 1: 87. 1933; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 594. 1933; 赵爱真, 植物分类学报 7: 247. 1958; 云南植物志 1: 89. 图版 23, 3—4. 1977 — *Aspidopterys cavaleriei* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 271. 1914, quoad specim. cit., non Lévl. 1911 — *Terminalia mairei* Lévl. Cat. Pl. Yunn. 35. 1915 — *C. incertum* Hand.-Mazz. l. c.; Chao l. c. 248 — *C. purpurascens* Hand.-Mazz. in Sinensia 3: 194. 1933; Chao l. c. 244 — *C. linyense* Hand.-Mazz. l. c. 195; Chao l. c. 244.

3a. 石风车子(原变种) 紫风车子, 凌云风车子, 瓦氏风车子(植物分类学报), 牛板金(四川) 图版 4: 3—4

var. *wallichii*

藤本, 稀为灌木或小乔木状; 幼枝压扁, 有槽, 淡灰褐色, 密被鳞片和微柔毛, 以后鳞片与柔毛渐脱落, 纵裂成纤维状剥落, 疏生, 黑色皮孔。叶对生或互生, 叶片椭圆形至长圆状椭圆形, 稀卵形, 长 5—13 厘米, 宽 3—6 厘米, 坚纸质, 先端短尖或渐尖, 稀钝圆, 基部渐