

毫米,宽3毫米;雄蕊约长1厘米,常5—8枚成束;花柱线形,比雄蕊略长。蒴果近球形,直径5—7毫米。花期每年多次。

原产澳大利亚。我国广东、台湾、福建、广西等地均有栽种,常植道旁作行道树,树皮易引起火灾,不宜于造林;树皮及叶供药用,有镇静神经之效;枝叶含芳香油,供药用及防腐剂。

## 2. 细花白千层 (广州植物志) 图版 6: 3

*Melaleuca parviflora* Lindl. Swan River App. 8. 1840; 广州植物志 5. 1956.——*Melaleuca preissiana* Schauer in Lehm. Pl. Preiss. 1: 143. 1843.

乔木,高12米;树皮灰色,稍坚实;嫩枝常有毛。叶小,互生,密集,叶片硬革质,披针形或长圆状披针形,长1—1.6厘米,宽3—5毫米,先端尖锐,基部钝,有7—9条直脉;无叶柄。花白色,密集于枝顶组成3—5厘米的穗状花序,总梗有柔毛;小苞片1片,线形,长3毫米;萼管卵形,长2毫米,有白毛,萼齿卵形,极短小;花瓣近圆形,宽约2毫米;雄蕊成束,长约6毫米;花柱稍超出。蒴果倒卵形,宽3—4毫米,基部狭窄。花期春季。

广东有栽培,生长较慢,40龄树干胸径不及30厘米,惟树形美观,可作行道树。

## 4. 岗松亚族——Subtrib. *Baeckea* Nied.

Nied. in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam. 3(7): 89. 1893.

花有短柄,单生或数朵排成聚伞花序;雄蕊定数,排成单列;叶对生,细小。

本亚族有1属。

## 5. 岗松属——*Baeckea* Linn.

Linn. Gen. Pl. 491. 1754 et Sp. Pl. 358. 1753; DC. Prodr. 3:

229. 1828; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 701. 1865; Duthie in

Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 463. 1878; Gagnep. in Lecte. Fl.

Gén. Indo-Chine 2: 789. 1920; 广州植物志 207. 1956; 海南植物

志 2: 2. 1965.

小乔木或乔木。叶线形或披针形,全缘,有油腺点。花小,白色或红色,5数,有短梗或无梗,腋生单花或数朵排成聚伞花序;小苞片2,细小,脱落;萼管钟形或半球形,常与子房合生,萼齿5,膜质,宿存;花瓣5,近圆形;雄蕊5—10枚或稍多(20),比花瓣短,花丝短,花药背部着生;子房下位或半下位,稀上位,2—3室,每室有胚珠数颗,花柱短,柱头稍扩大。蒴果开裂为2—3瓣,每室有种子1—3颗,稀更多;种子肾形,有角,胚直,无胚乳,子叶短小。



1—2. 红胶木 *Tristania conferta* R. Br.: 1.花枝, 2. 蒴果。3. 白  
千层 *Melaleuca leucadendron* Linn.: 花枝。(冯钟元绘)