

厘米,宽 2.3—3 厘米,先端渐尖或短尖,钝头,基部圆形或微心形,上面绿色发亮,下面颜色较浅,两面无毛,有无数透明腺点,侧脉每边约 5 条,稍明显,以近 45° 开角斜出,离边缘约 2 毫米处汇成边脉;叶柄极短,长约 1.5 毫米。花白色,稍芳香,单生或数朵聚生于叶腋,短于叶;萼片 4,长椭圆形,外反。浆果球形,直径 1—2 厘米,有 8 棱,熟时深红色,有种子 1—2 颗。 花期春季。

原产巴西。在我国南部有少量栽培。果肉多汁,稍带酸味,可食,并可制质良的软糖;又可栽植于盆中,结实时红果累累,极为美观。

2. 吕宋番樱桃(广州植物志)

Eugenia aherniana C. B. Robins. in Philipp. Journ. Sci. 4: 344. 1909; 广州植物志 207. 1956.

灌木或小乔木,高 3—9 米;树皮灰色。叶片革质,椭圆形或卵状椭圆形,长 2.5—4.5 厘米,宽 1.3—2.5 厘米,先端渐尖而钝头,基部楔形或钝,新鲜时上面深绿色,干时黄绿色,下面同色,但颜色稍浅,两面均有无数黑色腺点,侧脉每边约 7 条,纤细,斜升,离边缘 2 毫米处汇成一波浪式的边脉;叶柄极短,长约 2 毫米。花顶生或腋生。浆果扁圆形,直径约 7 毫米,有不很明显的纵棱数条,熟时红褐色。 果期冬月。

原产菲律宾群岛。我国南部有少量栽培。

2. 肖蒲桃族——Trib. *Acmenae* Melch.

Melch. in Engl. Syll. Pflanzenfam. 12 Aufl. 2 Band. 351. 1964.

胚不分化,呈单子叶状;种皮贴生在果皮上;胚体内部多分枝;药室分叉,顶孔开裂。我国有 1 属 1 种。

7. 肖蒲桃属——*Acmena* DC.

DC. in Dict. Class. Hist. Nat. 11: 401. 1827 et Prodr. 3: 262.

1828; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 8. 1938; 海南植物志 2: 11. 1965.

灌木或小乔木。叶对生,全缘,具羽状脉,有油腺点,具叶柄。花小,两性,排成聚伞花序或圆锥花序;萼管与子房合生,倒圆锥形或半球形,萼齿 4—5,短小,在花蕾时内卷;花瓣 5,细小,离生或连成帽状体;雄蕊多数,离生,插生于花盘外围,花丝短;花药细小,分叉,顶孔开裂;子房下位,2—3 室;胚珠少数,弯生,花柱短,基部较粗大。浆果近球形,种子 1 个,种皮与果皮连合;胚直,不分裂,子叶粘合,内面多裂。

选模式种: *Acmena polyantha* (Laut. et K. Schum.) Merr. et Perry.