

约 11 种, 分布于印度、马来西亚、印度尼西亚、中南半岛、中国南部、澳大利亚。我国产 1 种。

这个属和蒲桃属 *Syzygium* 很接近, 只是花药分裂, 顶孔开裂, 胚不分裂, 种子 1 个, 种皮与果皮连合。

De Candolle 成立这个属时所依据的 2 个种及 1 个变种, 都是蒲桃属的种类。经 E. D. Merrill 选用 *Xenodendron polyantha* Laut. et K. Schum. 为选模式, 该名称被认为是本属的异名。

1. 肖蒲桃(海南植物志) 图版 10: 1—6

Acmena acuminatissima (Blume) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 205. 1938; 海南植物志 2: 11. 图 295. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 995. 图 3720. 1972——*Myrtus acuminatissima* Blume Bijdr. 1088. 1826——*Eugenia subdecurrens* Merr. et Chun in Synyatsenia 2: 289. 1835.

乔木, 高 20 米; 嫩枝圆形或有钝棱。叶片革质, 卵状披针形或狭披针形, 长 5—12 厘米, 宽 1—3.5 厘米, 先端尾状渐尖, 尾长 2 厘米, 基部阔楔形, 上面干后暗色, 多油腺点, 侧脉多而密, 彼此相隔 3 毫米, 以 65° — 70° 开角缓斜向上, 在上面不明显, 在下面能见, 边脉离边缘 1.5 毫米; 叶柄长 5—8 毫米。聚伞花序排成圆锥花序, 长 3—6 厘米, 顶生, 花序轴有棱; 花 3 朵聚生, 有短柄; 花蕾倒卵形, 长 3—4 毫米, 上部圆, 下部楔形; 萼管倒圆锥形, 萼齿不明显, 萼管上缘向内弯; 花瓣小, 长 1 毫米, 白色; 雄蕊极短。浆果球形, 直径 1.5 厘米, 成熟时黑紫色; 种子 1 个。花期 7—10 月。

产广东、广西等省区。生于低海拔至中海拔林中。分布至中南半岛、马来西亚、印度、印度尼西亚、菲律宾等地。

3. 蒲桃族——Trib. Plinia Melch.

Melch. in Engl. Syll. Pflanzenfam. 12 Aufl. 2 Band. 351. 1964.

胚起分化, 有肉质子叶; 种皮粗糙, 疏松或紧贴在果皮上; 花药平行, 纵裂。

我国有 2 属。

8. 蒲桃属——*Syzygium* Gaertn.

Gaertn. in Fruct. 1: 166. t. 33. 1788; Benth. Fl. Hongk. 118.

1861; 广州植物志 202. 1956; 海南植物志 2: 12. 1965.

常绿乔木或灌木; 嫩枝通常无毛, 有时有 2—4 棱。叶对生, 少数轮生, 叶片革质, 羽状脉常较密, 少数为疏脉, 有透明腺点; 有叶柄, 少数近于无柄。花 3 朵至多数, 有梗或无梗,

顶生或腋生,常排成聚伞花序式再组成圆锥花序;苞片细小,花后脱落;萼管倒圆锥形,有时棒状,萼片4—5,稀更多,通常钝而短,脱落或宿存;花瓣4—5,稀更多,分离或连合成帽状,早落;雄蕊多数,分离,偶有基部稍微连合,着生于花盘的外围,在花芽时卷曲,花丝稍长,花药细小,丁字着生,2室,纵裂,顶端常有腺体;子房下位,2室或3室,每室有胚珠多数,花柱线形。浆果或核果状,顶部有残存的环状萼檐;种子通常1—2颗,种皮多少与果皮粘合;胚直,有时为多胚,子叶不粘合。

模式种: *Syzygium caryophyllaceum* Gaertn.

约500余种,主要分布于亚洲热带,少数在大洋洲和非洲。我国约有72种,多见于广东、广西和云南。其中洋蒲桃 *S. samarangense* (Blume) Merr. et Perry 常栽培供公用;另有引种的丁子香 *S. aromaticum* (Linn.) Merr. et Perry, 花蕾供医药及化学工业用;还有多花蒲桃 *S. polyanthum* (Wight) Walp. 供观赏。

分 种 检 索 表

1. 花大;萼齿肉质,长3—10毫米,宿存;果实大,果皮肉质;种子大,具丰富胚乳;侧脉疏远 组1. 蒲桃组 *Sect. Jambosa* Duthie
2. 花序顶生;叶基部楔形、圆形或微心形。
 3. 具聚伞花序,有花3—6朵。
 4. 叶片基部楔形;叶柄明显。
 5. 叶片披针形或长圆形,宽3—4.5厘米 1a. 蒲桃 *S. jambos* Alston var. *jambos*
 5. 叶片狭披针形,宽1.5—2.5厘米 2. 假多瓣蒲桃 *S. polypetaloides* Merr. et Perry
 4. 叶片基部圆形或微心形;叶柄不很明显。
 6. 叶片基部圆形;萼管长7—8毫米;浆果梨形或圆锥形 3. 洋蒲桃 *S. samarangense* Merr. et Perry
 6. 叶片基部微心形;萼管长1.5—2厘米;浆果卵状球形 4. 阔叶蒲桃 *S. latilimbum* Merr. et Perry
 3. 具圆锥花序,有花多于10朵。
 7. 圆锥花序有花3—11朵;萼管长8—9毫米。
 8. 花序长6—7厘米;花瓣长5毫米;花梗极短 5. 少花老挝蒲桃 *S. laosense* (Gagnep.) Merr. et Perry var. *quocens* (Gagnep.) Chang et Miao
 8. 花序长4—5厘米;花瓣长7—8毫米;花梗长5—20毫米 6. 短药蒲桃 *S. brachyantherum* Merr. et Perry
 7. 圆锥花序多花,萼管长6毫米
 9. 花序长3—5厘米;叶两面均有腺点,侧脉10—14对 7. 桂南蒲桃 *S. imitans* Merr. et Perry
 9. 花序长6—8厘米;叶上面略具光泽,侧脉13—20对 8. 滇南蒲桃 *S. austro-yunnanense* Chang et Miao
2. 花序腋生或生于无叶老枝上;叶片基部楔形。
 10. 花序生于无叶老枝上;萼管长1厘米;叶片椭圆形,宽6—8厘米

- 9. 马六甲蒲桃 *S. malaccense* Merr. et Perry
10. 花序腋生。
11. 叶片狭长圆形, 宽 3—4.5 厘米; 花序多花 10. 华夏蒲桃 *S. cathayense* Merr. et Perry
11. 叶片线形, 宽 2—2.5 厘米, 花单一 1b. 线叶蒲桃 *S. jambos* var *linearilimbum* Chang et Miao
1. 花小; 萼齿不明显, 长 1—2 毫米, 花后脱落; 果实较小, 果皮薄; 种子中等大或较小; 胚乳较薄 组 2. 小花蒲桃组 Sect. *Syzygium*
12. 花蕾棒形, 长于 1 厘米; 果实棒形或长壶形 系 1. 棒花系 Ser. *Claviflora* Chang et Miao
13. 嫩枝有棱。
14. 叶基部楔形, 叶柄明显, 叶片长 3—7 厘米; 花蕾长 1 或 2 厘米。
15. 聚伞花序腋生, 花蕾长 2 厘米, 花瓣分离 11. 台湾棒花蒲桃 *S. taiwanicum* Chang et Miao
15. 聚伞花序顶生, 花蕾长 1 厘米, 花瓣连成帽状体 12. 子凌蒲桃 *S. championii* Merr. et Perry
14. 叶基部微心形, 叶柄极短; 叶片长 4—12 厘米, 花蕾长 1.5 厘米 13. 无柄蒲桃 *S. boisianum* Merr. et Perry
13. 嫩枝圆形。
16. 花序顶生, 或兼有生于枝顶叶腋。
17. 叶片椭圆形, 长 4.5—9 厘米; 花序顶生; 萼管干后皱缩 14. 皱萼蒲桃 *S. rysopodum* Merr et Perry
17. 叶片狭长圆形, 长 3—7 厘米; 花序顶生及腋生; 萼管平滑 15. 纤枝蒲桃 *S. stenocladum* Merr. et Perry
16. 花序腋生, 或生于无叶老枝上。
18. 花序腋生; 萼管长约 1 厘米; 叶片长 8—15 厘米。
19. 叶片长 9—15 厘米, 宽 3.5—5 厘米, 侧脉相隔 6—8 毫米; 花瓣连成帽状体 16. 短棒蒲桃 *S. baviense* Merr. et Perry
19. 叶片长 8—13 厘米, 宽 3—4.5 厘米, 侧脉相隔 1—2 毫米; 花瓣离生 17. 纤花蒲桃 *S. leptanthum* Nied.
18. 花序生于无叶老枝上; 萼管长 1.5 厘米; 叶片长 12—21 厘米 18. 棒花蒲桃 *S. claviflorum* (Roxb.) Wall.
12. 花蕾倒圆锥形或稀为短棒状, 长不超过 7 毫米; 果实球形或椭圆卵形。
20. 圆锥花序常多枝丛出, 顶生近顶生或生于无叶老枝上, 叶脉疏远 系 2. 香胶蒲桃系 Ser. *Balsamea* Chang et Miao
21. 圆锥花序顶生; 花近无梗; 嫩枝圆形。
22. 嫩枝及叶下面有毛 19. 毛脉蒲桃 *S. vestitum* Merr. et Perry
22. 嫩枝及叶下面无毛。
23. 萼管长 3.5 毫米, 叶片长 7—10 厘米 20. 钝叶蒲桃 *S. cinereum* Wall.
23. 萼管长 2.5 毫米, 叶片长 10—21 厘米 21. 云南蒲桃 *S. yunnanense* Merr. et Perry

21. 圆锥花序生于老枝上, 或腋生, 花有梗或无梗, 嫩枝圆形或有棱。
24. 嫩枝有 4 棱。
25. 花无梗, 花瓣连成帽状体, 叶片长 12—18 厘米, 花序生于老枝上 22. 四角蒲桃 *S. tetragonum* Wall.
25. 花有梗, 花序腋生, 叶片长 6—10 厘米 23. 粗叶木蒲桃 *S. lasianthifolium* Chang et Miao
24. 嫩枝圆形。
26. 花序有花多数, 花蕾长 3 毫米, 花瓣连成帽状体, 花梗长 1—2 毫米 24. 香胶蒲桃 *S. balsameum* Wall.
26. 花序有花 4—7 朵, 花蕾长 6—7 毫米, 花梗长 4—8 毫米, 花瓣离生 25. 西藏蒲桃 *S. xizangense* Chang et Miao
20. 圆锥花序常单生, 顶生或腋生, 决不生于老枝上, 叶脉密, 相隔 1—4 毫米, 稀更疏 系 3. 高簷蒲桃系 *Ser. Oblata* Chang et Miao
27. 嫩枝有棱。
28. 花瓣连成帽状体, 花序腋生或顶生。
29. 叶片基部楔形, 有明显的叶柄; 花序顶生或腋生。
30. 花序顶生; 叶片长圆形, 长 4.5 厘米, 宽 1.5—2 厘米; 嫩枝有毛 26. 尖萼蒲桃 *S. acutisepalum* Mori
30. 花序腋生; 叶片披针形至椭圆形, 长 4—13 厘米, 宽 1—4 厘米; 嫩枝无毛。
31. 叶片狭长圆形或狭披针形, 花序长 1—4 厘米, 少花。
32. 叶片狭长圆形, 宽 1.2—3.5 厘米; 果实壶状球形 27. 怒江蒲桃 *S. salwinense* Merr. et Perry
32. 叶片狭披针形, 宽 1—1.8 厘米; 果实椭圆形 28. 硬叶蒲桃 *S. sterophyllum* Merr. et Perry
31. 叶片椭圆形, 花序长 3—8 厘米, 多花 29. 滇边蒲桃 *S. forrestii* Merr. et Perry
29. 叶片基部微心形, 无叶柄; 花序顶生 30. 方枝蒲桃 *S. tephrodes* Merr. et Perry
28. 花瓣离生。
33. 花序主要是腋生的, 或生于近枝顶叶腋。
34. 圆锥花序长 3—8 厘米, 多花; 叶片长 6—11 厘米, 宽 2.5—4 厘米 29. 滇边蒲桃 *S. forrestii* Merr. et Perry
34. 圆锥花序或聚伞花序长 1—3 厘米。
35. 叶片长 8—12 厘米, 宽 3—5 厘米; 果实球形, 直径 2.5—3 厘米 31. 广西蒲桃 *S. guangxiense* Chang et Miao
35. 叶片长 4—9 厘米, 宽 2—3 厘米; 果实球形, 直径小于 1.5 厘米 32. 细轴蒲桃 *S. tenuirhachis* Chang et Miao
33. 花序顶生, 有时兼为腋生。
36. 叶柄极短, 长 1—2 毫米; 果实球形。
37. 叶片基部圆形或钝, 或为微心形。
38. 叶片卵形, 4—5.5 × 2.5—3.5 厘米 33. 文山蒲桃 *S. wenshanense* Chang et Miao

38. 叶片线形至狭长圆形, 15—45 × 4—12 毫米 34. 狭叶蒲桃 *S. tsoongii* Merr. et Perry
37. 叶片基部楔形。
39. 叶片椭圆形, 长 1.5—3 厘米, 宽 1—2 厘米 35. 赤楠 *S. buxifolium* Hook. et Arn.
39. 叶片狭披针形或狭倒披针形, 宽 5—10 毫米。
40. 叶常轮生, 叶片狭披针形, 先端尖, 叶面的腺点干后不下陷, 背脉明显; 花梗长 3—4 毫米 36. 轮叶蒲桃 *S. grijsii* Merr. et Perry
40. 叶对生, 短小, 叶片倒披针形, 先端圆或钝, 叶面的腺点干后下陷, 背脉不明显; 花梗长 1—2 厘米 37. 倒披针叶蒲桃 *S. oblancilimum* Chang et Miao
36. 叶柄明显, 长 3—10 毫米; 果实球形或椭圆状卵形。
41. 叶片披针形或卵状披针形。
42. 叶片卵状披针形, 尾状渐尖; 花序长 1 厘米; 花梗长 2—3 毫米 38. 四川蒲桃 *S. szechuanense* Chang et Miao
42. 叶片披针形, 先端变狭而钝; 花序长 2—4 厘米; 花无花梗 39. 贵州蒲桃 *S. handelii* Merr. et Perry
41. 叶片椭圆形或长圆形。
43. 花无花梗或近无柄; 叶长 4—10 厘米; 果实椭圆状卵形。
44. 圆锥花序长 5—10 厘米; 花萼长 8—9 毫米 40. 滇西蒲桃 *S. rockii* Merr. et Perry
44. 圆锥花序长 1.5 厘米; 花萼长 3.5 毫米 41. 思茅蒲桃 *S. szemaense* Merr. et Perry
43. 花梗长 2—5 毫米; 叶长 4—7 厘米; 果实球形 42. 华南蒲桃 *S. austrosinense* Chang et Miao
27. 嫩枝圆形, 无棱。
45. 花瓣连成帽状体; 花序顶生或兼为腋生。
46. 果实球形。
47. 叶片卵状披针形或长圆形。
48. 叶长 9—14 厘米, 叶柄长 1—2 厘米; 花序长 4 厘米; 萼管平滑 43. 恒春蒲桃 *S. kusukusense* Mori
48. 叶长 3—7 厘米, 叶柄长 3—5 毫米; 花序长 2—4 厘米; 萼管干后皱缩 44. 香蒲桃 *S. odoratum* DC.
47. 叶片椭圆形或倒卵状长圆形。
49. 叶先端锐尖或急尖, 叶长 4—10 厘米; 花萼长 2.5—4 毫米。
50. 叶片薄革质, 下面干后黄褐色; 花萼长 2.5 毫米 45. 密脉蒲桃 *S. chunianum* Merr. et Perry
50. 叶片厚革质, 下面干后红褐色; 花萼长 4 毫米 46. 广东蒲桃 *S. kwangtungense* Merr. et Perry
49. 叶先端圆, 叶长 3—5 厘米; 花萼长 5 毫米 47. 圆顶蒲桃 *S. kashotense* Mori
46. 果实椭圆卵形。

51. 叶片基部圆形或微心形, 近无柄; 花序长 2—4 厘米 48. 黑嘴蒲桃 *S. bullockii* Merr. et Perry
51. 叶片基部楔形, 叶柄明显。
52. 花序长 3—9 厘米; 叶片长 8—12 厘米。
53. 叶片椭圆形; 花无梗; 花序轴无毛 49. 假乌墨 *S. angustinii* Merr. et Perry
53. 叶片线状披针形; 花有短梗; 花序轴有糠秕状毛 50. 竹叶蒲桃 *S. myrsinifolium* Merr. et Perry
54. 花小; 萼管长 3—4 毫米; 雄蕊长 4—7 毫米; 花柱长 8 毫米; 果实近球形 50a. 竹叶蒲桃 (原变种) *S. myrsinifolium* Merr. et Perry var. *myrsinifolium*
54. 花较大; 萼管长 5—6 毫米; 雄蕊长 8—10 毫米; 花柱长 1.2—1.5 厘米; 果实椭圆状壶形 50b. 大花竹叶蒲桃 (变种) *S. myrsinifolium* Merr. et Perry var. *grandiflorum* Chang et Miao
52. 花序长 1—2 厘米; 叶片长 4—7 厘米 51. 红枝蒲桃 *S. rehderianum* Merr. et Perry
45. 花瓣离生。
55. 花序腋生。
56. 圆锥花序长 4—11 厘米; 叶片椭圆形, 长 6—13 厘米。
57. 花序长达 11 厘米; 花有梗或无梗; 萼管长 4—8 毫米 52. 乌墨 *S. cumini* Skeels
58. 花有短梗, 萼管长 4 毫米 52a. 乌墨 (原变种) *S. cumini* Skeels var. *cumini*
58. 花无梗, 萼管长 7—8 毫米 52b. 长萼乌墨 (变种) *S. cumini* Skeels var. *tsai* Chang et Miao
57. 花序长 4—7 厘米; 萼管长 2—2.5 毫米; 花无梗 53. 簇花蒲桃 *S. fruticosum* (Roxb.) DC.
56. 圆锥花序或聚伞花序长 1—2 厘米。
59. 叶片线状披针形或狭长圆形, 宽 7—14 毫米; 果实球形 54. 水竹蒲桃 *S. fluviatile* Merr. et Perry
59. 叶片椭圆形; 果实球形或椭圆形。
60. 果实球形; 叶片短于 9 厘米。
61. 叶片长 3—9 厘米; 花蕾长 2—2.5 毫米; 果实宽 5—7 毫米。
62. 叶片阔椭圆形, 干后绿色; 花梗长 1—1.5 毫米 55. 卫矛叶蒲桃 *S. euonymifolium* (Metcalf) Merr. et Perry
62. 叶片狭椭圆形, 干后黑色; 花无梗 56. 红鳞蒲桃 *S. hancei* Merr. et Perry
61. 叶片长 3—4 厘米; 花蕾长 3—4 毫米; 果实宽 1—1.2 厘米 57. 假赤楠 *S. buxifolioides* Chang et Miao
60. 果实椭圆形或倒卵形, 长 1.2—1.5 厘米; 叶片长 8—11 厘米 58. 海南蒲桃 *S. hainanense* Chang et Miao
55. 花序顶生。
63. 花序短, 长不超过 3.5 厘米; 叶形各式。

64. 花蕾短棒状, 长 7—8 毫米, 有短梗; 叶片卵状披针形, 尾状渐尖。
65. 叶片 3—5.5 × 1—1.5 厘米; 萼管有粉白, 干后皱缩 59. 线枝蒲桃 *S. araiocladum* Merr. et Perry
65. 叶片 8—10.5 × 3—4.5 厘米; 萼管无粉白, 干后平滑 60. 锡兰蒲桃 *S. zeylanicum* DC.
64. 花蕾倒圆锥形; 萼管长度和宽度几相等, 通常长 2—3 毫米, 稀长为 6 毫米; 叶椭圆形至倒披针形。
66. 叶片长 8—20 厘米; 果实球形, 宽 1.5—2 厘米。
67. 叶片狭长圆形, 长 14—20 厘米, 侧脉相隔 4—6 毫米; 果实有粉白 61. 黑长叶蒲桃 *S. melanophyllum* Chang et Miao
67. 叶片椭圆形, 长 8—12 厘米, 侧脉相隔 1—2 毫米; 果实无粉白 62. 短序蒲桃 *S. brachythyrsum* Merr. et Perry
66. 叶片长 2.5—8 厘米; 果实球形, 宽 6—10 毫米, 稀更大。
68. 花无花梗。
69. 花 2—3 朵簇生, 排成聚伞花序或圆锥花序。
70. 圆锥花序 2—3 次分枝; 萼管长 3 毫米 63. 细脉蒲桃 *S. euphlebiun* Mori
70. 聚伞花序少花; 萼管长 2—2.5 毫米。
71. 叶片长圆形; 聚伞果序的 2 个侧生果实无柄, 中央的有柄 64. 尖峰蒲桃 *S. jienfunicum* Chang et Miao
71. 叶片椭圆形; 聚伞花序 3 朵花均无梗 65. 万宁蒲桃 *S. howii* Merr. et Perry
69. 花 7—9 朵簇生于花序柄上; 叶片长圆状倒披针形, 长 4—6 厘米 66. 团花蒲桃 *S. congestiflorum* Chang et Miao
68. 花有长 1—2 毫米的花梗。
72. 圆锥花序长 3.5 厘米, 2—3 次分枝; 叶片椭圆形, 长 6 厘米 67. 台湾蒲桃 *S. formosanum* Mori
72. 聚伞花序长 1.5—2 厘米, 少花; 叶片倒披针形, 长 5—8 厘米 68. 石生蒲桃 *S. saxatile* Chang et Miao
63. 花序长 4—10 厘米; 叶片椭圆形。
73. 花序轴有糠秕状毛 69. 山蒲桃 *S. levinei* Merr. et Perry
73. 花序轴无毛。
74. 花有梗; 花蕾长 5 毫米; 叶片长 9—15 厘米; 侧脉相隔 2—6 毫米; 果实球形。
75. 叶片长 10—15 厘米, 侧脉相隔 3—6 毫米, 叶面干后黑色; 花梗长 2—3 毫米 70. 黑叶蒲桃 *S. thumra* Merr. et Perry
75. 叶长 9—12 厘米, 侧脉相隔 2—3 毫米, 干后灰褐色; 花梗长约 1 毫米 71. 高簷蒲桃 *S. oblatum* Wall
74. 花无梗; 花蕾长 6—7 毫米; 叶片长 6.5—9.5 厘米, 侧脉密, 相隔 1—1.5 毫米。
76. 圆锥花序长 4—6 厘米; 叶下面红褐色; 雄蕊长 3 毫米 72. 褐背蒲桃 *S. infra-rubiginosum* Chang et Miao
76. 圆锥花序长 8—10 厘米; 叶下面浅褐色; 雄蕊长 5—7 毫米 73. 长花蒲桃 *S. lineatum* Merr. et Perry

组 1. 蒲桃组——*Sect. Jambosa* Duthie in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 2: 471. 1878.

花序聚伞状；花大；萼齿肉质，长3—10毫米，宿存；果实大，果皮肉质；种子大；胚乳丰富；叶片侧脉疏远。

有9种及1变种。

1. 蒲桃(广州植物志)

Syzygium jambos (Linn.) Alston in Trimen *Fl. Ceyl.* 6 (Suppl.): 115. 1931; Merr. et Perry in *Journ. Arn. Arb.* 19: 114, 217. 1938; 广州植物志 203. 1956; 海南植物志 2: 14. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 992. 图 3714. 1972——*Eugenia jambos* Linn. *Sp. Pl.* 470. 1753; Lour. *Fl. Cochinch.* 307. 1790 et ed. Willd. 375. 1793; Roxb. *Fl. Ind.* ed. 2, 2: 69. 1832; Duthie in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 2: 474. 1878; Dunn & Tutchet in *Kew Bull. Add. Ser.* 10: 104. 1912; Gagnep. in *Lect. Fl. Gén. Indo-Chine* 2: 834. 1921; Ridley *Fl. Mal. Penin.* 1: 724. 1922; Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* 5: 136. 1927; Walker in *Lingnan Sci. Journ.* 6: 133. 1928——*E. malaccensis* sensu Lour. *Fl. Cochinch.* 306. 1790, ed. Willd. 374. 1793, non Linn.——*Myrtus jambos* HBK. *Nov. Gen. Sp. Pl.* 6: 144. 1823——*Jambosa vulgaris* DC. *Prodr.* 3: 286. 1828; Hook. in *Curtis's Bot. Mag.* 61: t. 3356. 1834; Benth. *Fl. Hongk.* 120. 1861——*Syzygium okudai* Mori in *Trans. Nat. Hist. Soc. Form.* 28: 440. f. 1938.

1a. 蒲桃(原变种)

var. *jambos*

乔木，高10米，主干极短，广分枝；小枝圆形。叶片革质，披针形或长圆形，长12—25厘米，宽3—4.5厘米，先端长渐尖，基部阔楔形，叶面多透明细小腺点，侧脉12—16对，以45°开角斜向上，靠近边缘2毫米处相结合成边脉，侧脉间相隔7—10毫米，在下面明显突起，网脉明显；叶柄长6—8毫米。聚伞花序顶生，有花数朵，总梗长1—1.5厘米；花梗长1—2厘米，花白色，直径3—4厘米；萼管倒圆锥形，长8—10毫米，萼齿4，半圆形，长6毫米，宽8—9毫米；花瓣分离，阔卵形，长约14毫米；雄蕊长2—2.8厘米，花药长1.5毫米；花柱与雄蕊等长。果实球形，果皮肉质，直径3—5厘米，成熟时黄色，有油腺点；种子1—2颗，多胚。花期3—4月，果实5—6月成熟。

产台湾、福建、广东、广西、贵州、云南等省区。喜生河边及河谷湿地。华南常见野生，也有栽培供食用。分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚等地。

1b. 线叶蒲桃(变种)

var. *linearilimbus* Chang et Miau in *Act. Bot. Yunnan.* 4(1): 17. 1982.

小乔木，嫩枝有浅沟，圆形。叶片革质，线形，长18—26厘米，宽2—2.5厘米，先端渐