

4. 阔叶蒲桃(海南植物志) 图版 11: 1—3

Syzygium latilimbum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 216. 1938; 海南植物志 2: 14. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 993. 图 3716. 1972.

乔木,高 20 米;嫩枝稍压扁,干后绿色。叶片狭长椭圆形至椭圆形,长 14—30 厘米,宽 6—13 厘米,先端渐尖,基部圆形,有时微心形,上面干后绿色,无光泽,下面浅绿色,无明显腺点,侧脉 15—22 对,平缓斜行,离边缘 4—5 毫米处互相结合成边脉,靠近边缘 1.5 毫米处另有 1 条不明显的边脉,侧脉间相隔 1—1.3 厘米,有明显网脉;叶柄长 5—10 毫米。聚伞花序顶生,有花 2—6 朵,总梗极短;花大,白色,花梗长 6—8 毫米;萼管长倒锥形,长 1.5—2 厘米,上部宽 1.5 厘米,萼齿 4,圆形,长 6—7 毫米,宽 8—9 毫米;花瓣分离,圆形,长 2 厘米;雄蕊极多,长 2.5—3 厘米;花柱长约 4 厘米。果实卵状球形,长 5 厘米。花期 4 月。

产广东、广西、云南的南部及西南部。见于湿润的低地森林。分布于泰国及越南等地。

5. 少花老挝蒲桃 图版 12: 2—3

Syzygium laosense (Gagnep.) Merr. et Perry var. *quocense* (Gagnep.) Chang et Miau, comb. nov.—*Eugenia laosensis* Gagnep. var. *quocensis* Gagnep. in Lecte. Not. Syst. 3: 327. 1918.

小乔木,高 3—10 米;嫩枝圆形,干后灰褐色。叶片薄革质,卵状长圆形或长圆形,长 11—17 厘米,宽 4—6 厘米,先端渐尖,尖头钝,基部阔楔形,稍不等侧,上面干后灰褐色,无光泽,下面带褐色,侧脉 8—12 对,相隔 8—12 毫米,以 55° 开角斜向上,离边缘 3—4 毫米处相结合成边脉,在上面隐约可见,在下面稍突起,网脉在下面明显;叶柄长 5—7 毫米。圆锥花序顶生或腋生,长 6—7 厘米,分枝疏而长;花有短梗;花蕾卵圆形,长 1 厘米;萼管半球形,长 7 毫米,基部有狭窄的短柄,萼齿 4,半圆形,长 3 毫米,宽 5 毫米,先端圆;花瓣 4,近圆形,长 4—5 毫米;雄蕊约与花瓣同长;花柱长 7—8 毫米。花期 11 月。


产云南西双版纳及河口一带。生低海拔常绿林中。也分布于柬埔寨。

较之原变种,本变种的花序较短,而且花朵较少。

6. 短药蒲桃(海南植物志) 图版 11: 4—5

Syzygium brachyantherum Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 218. 1938; 海南植物志 2: 15. 1965.

灌木或小乔木,高 3—12 米;嫩枝圆形,稍压扁。叶片薄革质,椭圆形或狭椭圆形,长 9—16 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端急短尖,基部阔楔形,上面干后暗绿色,不发亮,下面同色,多腺点,侧脉 12—17 对,以 55° 开角斜向上,离边缘 1.5 毫米处相结合成边脉,侧脉间相隔 7—9 毫米,有明显网脉;叶柄长 1—1.3 厘米。聚伞花序或圆锥花序,顶生,有花 3—11 朵,总梗长 1—1.5 厘米;花梗长 5—20 毫米,花中等大;花蕾卵圆形,长 1—1.2 厘米;



1—3. 阔叶蒲桃 *Syzygium latilimbum* Merr. et Perry: 1. 叶, 2. 花序, 3. 果。4—5. 短药蒲桃 *S. brachyantherum* Merr. et Perry: 4. 叶, 5. 果。(冯钟元, 邓晶发绘)