

#### 4. 阔叶蒲桃(海南植物志) 图版 11: 1—3

*Syzygium latilimbum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 216. 1938; 海南植物志 2: 14. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 993. 图 3716. 1972.

乔木,高 20 米;嫩枝稍压扁,干后绿色。叶片狭长椭圆形至椭圆形,长 14—30 厘米,宽 6—13 厘米,先端渐尖,基部圆形,有时微心形,上面干后绿色,无光泽,下面浅绿色,无明显腺点,侧脉 15—22 对,平缓斜行,离边缘 4—5 毫米处互相结合成边脉,靠近边缘 1.5 毫米处另有 1 条不明显的边脉,侧脉间相隔 1—1.3 厘米,有明显网脉;叶柄长 5—10 毫米。聚伞花序顶生,有花 2—6 朵,总梗极短;花大,白色,花梗长 6—8 毫米;萼管长倒锥形,长 1.5—2 厘米,上部宽 1.5 厘米,萼齿 4,圆形,长 6—7 毫米,宽 8—9 毫米;花瓣分离,圆形,长 2 厘米;雄蕊极多,长 2.5—3 厘米;花柱长约 4 厘米。果实卵状球形,长 5 厘米。花期 4 月。

产广东、广西、云南的南部及西南部。见于湿润的低地森林。分布于泰国及越南等地。

#### 5. 少花老挝蒲桃 图版 12: 2—3

*Syzygium laosense* (Gagnep.) Merr. et Perry var. *quocense* (Gagnep.) Chang et Miau, comb. nov.——*Eugenia laosensis* Gagnep. var. *quocensis* Gagnep. in Lecte. Not. Syst. 3: 327. 1918.

小乔木,高 3—10 米;嫩枝圆形,干后灰褐色。叶片薄革质,卵状长圆形或长圆形,长 11—17 厘米,宽 4—6 厘米,先端渐尖,尖头钝,基部阔楔形,稍不等侧,上面干后灰褐色,无光泽,下面带褐色,侧脉 8—12 对,相隔 8—12 毫米,以  $55^\circ$  开角斜向上,离边缘 3—4 毫米处相结合成边脉,在上面隐约可见,在下面稍突起,网脉在下面明显;叶柄长 5—7 毫米。圆锥花序顶生或腋生,长 6—7 厘米,分枝疏而长;花有短梗;花蕾卵圆形,长 1 厘米;萼管半球形,长 7 毫米,基部有狭窄的短柄,萼齿 4,半圆形,长 3 毫米,宽 5 毫米,先端圆;花瓣 4,近圆形,长 4—5 毫米;雄蕊约与花瓣同长;花柱长 7—8 毫米。花期 11 月。


产云南西双版纳及河口一带。生低海拔常绿林中。也分布于柬埔寨。

较之原变种,本变种的花序较短,而且花朵较少。

#### 6. 短药蒲桃(海南植物志) 图版 11: 4—5

*Syzygium brachyantherum* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 218. 1938; 海南植物志 2: 15. 1965.

灌木或小乔木,高 3—12 米;嫩枝圆形,稍压扁。叶片薄革质,椭圆形或狭椭圆形,长 9—16 厘米,宽 2.5—5 厘米,先端急短尖,基部阔楔形,上面干后暗绿色,不发亮,下面同色,多腺点,侧脉 12—17 对,以  $55^\circ$  开角斜向上,离边缘 1.5 毫米处相结合成边脉,侧脉间相隔 7—9 毫米,有明显网脉;叶柄长 1—1.3 厘米。聚伞花序或圆锥花序,顶生,有花 3—11 朵,总梗长 1—1.5 厘米;花梗长 5—20 毫米,花中等大;花蕾卵圆形,长 1—1.2 厘米;



1—3. 阔叶蒲桃 *Syzygium latilimbum* Merr. et Perry: 1. 叶, 2. 花序, 3. 果。4—5. 短药蒲桃 *S. brachyantherum* Merr. et Perry: 4. 叶, 5. 果。(冯钟元, 邓晶发绘)

萼管长8—9毫米，萼齿4，三角卵形，长5毫米；花瓣分离，阔卵形，长7—8毫米；雄蕊长短不一，长1—1.5厘米，花药极短，长0.6毫米；花柱长1.3厘米。果实近球形，直径2.5厘米。花期4—8月。

产广东海南、广西及云南等地。生于中海拔、山谷密林中。

#### 7. 桂南蒲桃 图版12: 1

*Syzygium imitans* Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 113. 1938.

乔木，高8米；嫩枝圆形，干后褐色。叶片革质，长圆形，长12—17厘米，宽4—7厘米，先端急尖，尖头长7—8毫米，末端钝，上面干后橄榄绿色，稍发亮，下面黄褐色，两面均有腺点，侧脉10—14对，相隔8—12毫米，以50°开角斜向上，靠近边缘2—4毫米结合成边脉，外侧离边缘0.7毫米处另有1条小边脉；叶柄长1厘米。圆锥花序顶生，长3—5厘米，多花，从基部发出分枝；花3朵簇生，花梗长2—3毫米；花蕾倒卵形，长8—11毫米，宽约6毫米；萼管长6毫米，倒圆锥形，萼齿4，半圆形，长1—2毫米，宽2.5毫米，先端圆；花瓣分离，近圆形，长4—5毫米；雄蕊长4—8毫米；花柱长4—7毫米。果实球形，直径1.6厘米。花期9月。

产广西十万大山。常见于低海拔的山谷。也分布于越南。

#### 8. 滇南蒲桃 八家妙(云南勐海傣语)

*Syzygium austro-yunnanense* Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 17. 1982.

乔木，高约13米；小枝四棱形，干后灰褐色。叶片革质，椭圆形或长圆形，长10—18厘米，宽4—7厘米，顶端短急尖，具钝尖头，基部宽楔形，上面橄榄绿色，略具光泽，下面褐绿色，侧脉13—20对，脉间6—10毫米，以70°开角斜行向上，离边缘2毫米处相结合成边脉，上面明显，下面隆起，小脉网状，明显；叶柄长1—1.5厘米。圆锥花序顶生，长6—8厘米，花3朵簇生，小苞片披针形，长2.5毫米；花瓣4，分离；雄蕊伸出。果实球形，直径1.5—2厘米(未成熟)，宿存萼片4，卵形或半圆形，长3—4毫米，宽5毫米；种子1—2个。果期约11月。

产云南西双版纳及广西的横县等地。见于海拔1400—1630米(云南)的山谷，疏林中阴湿处。

#### 9. 马六甲蒲桃

*Syzygium malaccense* (Linn.) Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 215. 1938—*Eugenia malaccensis* Linn. Sp. Pl. 470. 1753—*Eugenia macrophylla* Lam. Encycl. 3: 196. 1789—*Jambosa domestica* Blume Mus. Bot. Lygd.-Bat. 1: 91. 1849.

乔木，高15米；嫩枝粗大，圆形，干后灰褐色。叶片革质，狭椭圆形至椭圆形，长16—24厘米，宽6—8厘米，先端尖锐，基部楔形，上面干后暗绿色，无光泽，下面黄褐色，侧脉